


卷

十一

吉慶堂



濟陰綱目卷之十一

關中

武之

望叔

武林

張志聰隱庵父訂正

濟陰綱目卷之十一

關中 武之望叔卿父輯著 武林 張志聰隱庵父訂正

西陵 汪 淇瞻子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

○產後上

○論產後調理法

大全云凡生產畢飲熱童便一盞不得便臥宜閉目少坐須臾上
牀宜仰臥不宜側臥宜豎膝未可伸足高倚牀頭厚鋪衾褥遮圍
四壁使無孔隙免致賊風及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更以
手從心擗至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆不問腹
痛不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服酒雖行血亦不
可多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食白粥少許一月之後宜食

至信

皆新產切實
治法須熟之

產後雖當大
補亦宜審處

羊肉猪蹄少許。仍慎言語。七情寒暑。梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰蓐勞。最難治療。初產時。不可問是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷牙。恐致血逆。須血氣平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重如山嶽。可不戒哉。陳藏器云。漬苧汁。與產婦服之。將苧蘇與產婦枕之。止血暈。產婦腹痛。以苧安腹上。則止。產婦將息。如法臟腑調和。庶無諸疾。苦須先服黑神散。四物湯。四順理中丸。七寶散。若壯熱頭痛。此乳脉將行。用玉露散。頭目不清。是血暈。用清魂散。粥食不美。是胃氣虛。用四順理中丸。

論產後大補血氣為主

丹溪曰。產後當大補血氣為主。雖有雜證。以未治之。○產後為補虛。

產者無內傷
外感虛實同
如庶為合理
就輕用淡參
人所易忽却
最妙
法言

此論出肩方
發揮其血病
治血以下尚
有寒者溫之
熱者清之類
者行之虛者
補之血多者
止之五旬似
不可少姑識
之以便採擇

丹溪曰。產後當大補血氣為主。雖有雜證。以未治之。○產後為補虛。用參朮黃著陳皮歸身尾川芎炙甘草如發熱輕則加茯苓淡滲之。其執自除。重則加乾薑。○凡產後有病。先固氣血。○產後一切病多是血虛。皆不可發表。○新產後不可用苦藥。以其酸寒能伐生發之氣故也。○大抵胎前毋滯。產後毋虛。

○論產後服熱藥之誤

丹溪曰。或問新產之婦。好血已虧。汚血或留。彼黑神散。非要藥乎。答曰。至哉。坤元萬物資生。理之常也。初產之婦。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥為。飲食起居。勤加調護。何病之有。誠有汚血。體怯而寒。與之數帖。亦自簡便。或有他病。當求病起何因。病在何經。氣病治氣。血病治血。何用拘執此方。例令服餌。設有性急者。形瘦者。本有怒火者。夏月坐蓐者。時在火令。薑桔皆為禁藥。

生於將護之法。尤爲悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲具在訓戒。胡爲以羊雞濃汁作糜。而又常服當歸建中湯。四順理中丸。雖是補劑。並是偏熱。臟腑無寒。何處消受。若夫兒之初生。母腹頓寬。便啖鷄子。且喫火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。展轉生證。不知所因。率爾用藥。寧不誤人。予每見產婦之無疾者。必教之以却去黑神散。與夫雞子火鹽。諸品肉食。且與白粥將理。間以些少石首鯊煮令甘。澹食之。半月後方與少肉。若雞子亦須豁開澹煮。大能養胃却疾。彼富貴之家。驕恣之婦。卒有白帶頭風。氣痛膈塞。痰逆口乾。經事不調。髮禿體熱等證。皆是陽盛陰虛之病。天生血氣本自和平。曰盛曰虛。又烏知非此等謬妄。有以兆之耶。

○論新產三病

讀此則知症亦有外來不可專主氣血不足而驟用神劑反致不救也

至言

不可服湯謂不可服補氣之劑故羊肉湯亦俟塊散後服

仲景云問新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒三者大便難何謂也斷曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘕亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒即今世所謂血暈也

○產後諸忌

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百疾滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不出此早行房故也○產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩三日消息可服澤蘭丸此至滿月凡藥盡為佳不爾虛損不可平復也至極消瘦不可救者服五石澤蘭丸補之服法必七日之外不得早服也○凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百疾競起迄至於死百方病不能差桃仁煎主之出蓂

後服之。婦人總令無病。每至秋冬須服一二劑。以至年內常將服之佳。

○脉法

不調字并附
骨不絕字重
看

脉經云。診婦人生產之後。寸口脉洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。○婦人新生乳子脉沉小滑者生。實大堅弦急者死。

洪數中得胃
氣者亦生堅

丹溪曰。產前脉細小。產後脉洪大者多死。○又曰。產前脉當洪數。

暈者死亦須
審原稟脉何

既產而洪數刻故者多主死。此亦大槩言之。今見產後豈無脉洪數而生者。

如乃當知

○胞衣不下

大全云。夫有產兒出。胞衣不落者。世謂之息胞。由產初時用力比產兒出而體已疲憊。不復能用力。產胞經停之間。而外冷乘之。則血道澹。故胞之不出。須急以方藥救治。不妨害於兒所奈者。胞繫

連兒臍胞不出。則不得以時斷。臍絡必結。氣血俱見。則成疔。也。產後須服四時方向并避五

連兒臍胞不出。卽不得以時斷臍。浴洗冷氣。傷兒則成病也。舊法胞衣不出。恐損兒者。依法截臍而已。產處須順四時。方向并避五行禁忌。若有觸犯。多令產婦難產。

郭稽中論曰。胎衣不下者。何答曰。母生子訖。流血入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者。難治。但與奪命丹以逐去衣中之血。血散脹消。胎衣自下。牛膝湯亦效。

薛氏曰。有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損。而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。以消瘀血。緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散。以補固元氣。

草麻子小驗

作嘔者，猶
力出也，設不
能出，徒傷氣
血。
此方最捷。

亦出。如腸不收，仍用此膏塗腦頂，則腸自收。益母丹亦效。
家人婦胎衣不落，胸腹脹痛，手不敢近，此瘀血為患。用熟酒下失
笑散一劑，惡露胎衣並下。

一產婦胎衣不出，腹不脹痛，手按之痛稍緩，此是氣虛而不能送
出，用無憂散而下。前證余詢諸穩婆云：宜服益母草丸，或就以產
婦頭髮入口作嘔，胎衣自出。其不出者必死，授與前法甚效。

一產婦產後面赤，五心煩熱，敗血入胞，胞衣不下，有冷汗，思但去
其敗血，其衣自下。遂用黑豆二合炒透，然後燒紅鐵秤錘，同豆碎
酒，將豆淋酒化下。益母丹二丸，胞衣從血而出，餘證盡平。

奪命丹。治胞衣不下，益兒之初生，惡血流入衣中，為血所脹塞，
故不得下。須臾冲上逼心，即死。急服此藥。

此即法中
配服有神

黑附子炮五錢 牡丹皮一兩 乾漆炒烟盡二錢五分

右爲細末。用米醋一升。大黃末一兩。同煮成膏。和前藥爲丸。如

桐子大。每服五七丸。溫酒下。

奪命丸。治胞衣不下。並治胎死。

牡丹皮 桃仁 茯苓 赤芍 桂心各等分

右爲末。蜜九。彈子大。每一丸醋湯化下。或葱白煎濃湯下。尤妙。

連進兩丸。死胎腐爛立出。

牛膝湯。治胞衣不出。臍腹堅脹急痛。即殺人。服此藥胞即爛下。

死胎亦下。

牛膝 瞿麥各四兩 當歸尾 通草各六兩 滑石八兩 葵子五兩

一方有桂心二兩。

穩當之極妙
膏桂四錢

煨法九法服
法俱奇妙

右細切以水九升煮取三升分三服

牛膝散 治胞衣不出腹中脹痛急服此藥腐化而下緩則不救

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃

各七錢半當歸一兩桂心五錢

右剉每服五錢加生薑三片生地黃一錢水煎服

加桂芎歸湯 有胎衣不下因產母元氣虛薄者以此溫之自下

川芎

當歸各二錢官桂四錢

右剉一服水煎服

黑龍丹

治難產及胞衣不下血迷血暈不省人事一切危急惡

證垂死者但灌藥得下無不全活

當歸

五靈脂

川芎

良薑

熟地黃

各二兩剉碎入砂鍋

內紙筋鹽泥

固濟火煨過

百草霜一兩

硫黃

乳香

各二錢

琥珀

花蕊石

火煨入生薑

花蕊石各一錢

右爲細末醋糊丸如彈子大每用一二丸炭火煨紅投入生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

花蕊石散治產後敗血不盡血迷血暈胎死腹中胎衣不下至死心頭煖者急用一錢化下卽出其効如神

花蕊石一觔上色硫黃四兩各一觔

右和勻先用紙泥封固瓦礫一箇入二藥仍封固陰乾如急用以火籠內炙乾用炭火煨赤去火次日取出研細每服一錢童便熱酒下

一方胞衣不出

牛膝一兩葵子一合

右剉以水一升煮半升去渣分二服。

千金備急丸。治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊。

錦紋大黃一兩爲細末用醪醋半升同煎如膏丸如桐子大溫醋湯下五丸或七丸須臾惡下卽愈。

胡氏法。治產後胞衣不下惟有花蘂石散一件最爲要緊若鄉

居藥局遠者倉卒無之今有一妙法產訖胞衣不下稍久則血流胞中爲血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潤入胸中胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人屢驗。

治胞衣不下雜方。

五靈脂爲細末。溫酒調下二錢。

一方取小麥合小豆煮濃汁飲之立出。

一方皂角刺燒爲末。溫酒調下一錢。

一方蛇退燒爲細末。酒下二錢。

一方黑豆一合炒熟入醋一盞煎三五沸去豆分三服。酒煮亦可。

一方取竈內黃土一斗研細醋調勻納于臍中。續煎甘草湯三四

合服之出。

一方墨三寸爲末酒服。

一方生地黃汁一升苦酒三合煖服之。

一方竈突墨三指撮許以水苦酒調服立出。

一方雞子一枚苦酒一合和飲之。

一方。生男吞小豆七枚。生女吞十四枚。即出。

一方。浸葶水。濃煮。飲三碗。立下。

一方。取產母鞋底炙熱。熨大小腹上。下二七次。

一方。取初洗兒湯。服下一盞。勿令產母知。

一方。菰蘆實一個。取子研細。用酒重便。各半盞。相和煎至七分。去

滓。溫服。如無實根亦可。

一方。紅花一兩。酒煮濃汁服。

一方。以鹿角鎊爲屑。研細三分。煮葱白湯調下。

一方。凡欲產時。必先脫常所着衣。以籠籠胞衣。自下。仍易產。

一方。取夫單衣蓋井上。立出。

○血暈。厥逆附。

大全云。產後血暈者。由敗血流入肝經。以致眼黑頭旋。不能起坐。或東面。則黑。則神。故。最。生。皆。作。暗。風。

血暈厥逆附

一條鉄用心
使力過多作
暈治注大都
以清心涼血
補益爲主如
後保金集方
用童便或麥
門烏梅之類
皆可而薛氏
用補中益氣
者爲勞力也
若用心則殊
妙安神丸亦
黃連于產后
不宜則存乎
用者

醋解法收其

大全云產後血暈者由敗血流入肝經以致眼黑頭旋不能起坐
甚至昏悶不省人事謂之血暈以陳酒調黑神散最佳若作暗風
中風治之誤矣血熱乘虛逆上湊心以致昏迷不省氣閉欲絕者
服重便最妙然其由有三有用心使力過多而暈者有下血過多
而暈者有下血少而暈者其暈雖同治之則異當審詳之下血多
而暈者昏而煩亂而已當以補血清心藥下血少而暈者乃惡露
不下上搶于心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥
占法云產婦分娩訖預將秤錘或黃石子硬炭燒令通赤置器中
急于牀上以醋沃之得醋氣可除血暈產後一月內時作爲妙崔
氏云凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空虛所致欲分娩者第一
須先取醪醋以塗口鼻仍置醋于傍使聞其氣兼細細飲之此爲

神水解法清
其熱燥乾漆
者散其血迷
于上也俱妙

上法如覺暈卽以醋噴面甦來卽飲醋仍少與解之一云仍少一與水解之一

法燒乾漆令烟濃熏產母面卽醒如無乾漆取舊漆器火燒烟熏亦妙

郭稽中曰產後血暈者何答曰產後血氣暴虛未得安靜血隨氣

上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣

冷醫者不識呼爲暗風若作此治證必難愈但服清魂散卽省

薛氏曰產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神

昏口噤或痰壅盛者急用失笑散主之若血下多而暈或神昏煩

亂者大劑芩歸湯補之或芸臺子散或童子小便有痰加二陳湯

若因勞心力而致者宜補中益氣湯加香附若因氣血虛極不省

人事用清魂散惟以芩歸湯及大補氣血之劑凡產可用醋漆器

熏或用半夏末冷水和丸人鼻孔中並無前患丹溪先生云血暈

因氣血俱虛痰火犯上宜以二陳湯加礞石或加減礞石或加減礞石

保生無憂散
見前臨月東
胎方上

產婦不宜飲
酒

因氣血俱虛。痰火泛上。宜以二陳導痰。或加減硃砂安神丸。以麥
門冬湯下。亦可。大凡產後口眼喎斜等證。當大補氣血為主。而兼
以治痰。若脾胃虛而不能固者。用六君子湯。至五個月。當服安胎
散。至八九個月。再加大腹皮黃楊腦。如臨產時。更宜服保生無憂
散。自無前患。

家人婦產後。小腹作痛。忽牙關緊急。灌以失笑散。良久而甦。又用
四物加炮薑白朮陳皮而愈。

一產婦因產飲酒。惡露甚多。患血暈。口出酒氣。此血得酒熱而妄
行。虛而作暈也。以佛手散加乾葛二錢。一劑而痊。酒性慄悍。八月
及產後不宜飲。恐致前證。產室人衆喧嚷。氣熱亦致此證。
奉化陸嚴治新昌徐氏婦病。產後暴死。但胸膈微熱。陸診之曰。此

血悶也。用紅花數十斤，以大鍋煮之。候湯沸，以木桶盛之。將病者寢其上，熏之。湯氣微，復加之。有頃，婦人指動。半日遂甦。此與許胤宗治王太后之意同。

仲景云產婦鬱胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故常汗出陰陽乃復所以大便堅嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日更發熱者此爲胃實人承氣湯主之

今按鬱胃卽暈也觀此則產後血暈有汗下和解三法當分表裏虛實精而別之

清魂散

故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷宜先服
乾漆或漆器燒烟鼻中熏之頻置醋炭房內次進此藥即醒

澤蘭葉

人參各二錢半

川芎半兩

荊芥穗一兩

甘草二錢

右為細末每服二錢用溫酒熱湯各半盞或入童便調急灌之
下咽眼即開氣定即醒

芎歸湯 治產後去血過多昏暈不醒

芎藭

當歸去蘆酒洗
焙各等分

右咬咀每服四錢水煎熱服不拘時如腹中刺痛加酒炒白
芍藥甚者加桂心口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾
薑白芍藥水停心下微有嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠
加人參竹葉

保命集方。治產後血暈危。因此下多血虛也補之。

當歸炒 赤芍藥炒各錢半 生地黃汁一大盞

右剉水煎三五沸。溫服。如覺煩熱。去當歸。八童便半盞服之。

當歸辛溫煩熱者恐不投故去之

醋墨。纔產便服。免致昏暈。

松烟墨或京墨不拘多少。用炭火煨紅。以米醋淬之。再煨。再

酒不如醋醃不如童便

淬如此七次。研極細。纔產畢。即用一二錢。以童子小便調下。

淡醋湯。溫酒亦可。

獨行散。治產後血暈昏迷不省。沖心悶絕。

五靈脂半生半炒為末。每服二錢。溫酒調灌。入喉。即愈。不愈

更加蒲黃炒等分。各失笑散。一方加荊芥等分。童便調下。

病。治產後血暈。血入心經。言此頭倒。從心失志。及產後而

奪命散。治產後血暈血入心經。言語顛倒。健忘失志。及產後百

病。

血竭

沒藥各等分

右爲末。纔產下。便用童便與細酒各半盞。煎一二沸。調下二錢。良久再服。其惡血自下行。更不冲上。或只用白湯調下。

四味散。治產後一切諸疾。纔方分娩。一服尤妙。

當歸

玄胡索

血竭

沒藥各等分

右爲細末。每服二錢。用童子小便一盞。煎六分。通口服。如心膈寒。倍當歸。氣悶喘急。倍玄胡索。惡露不快。倍血竭。心腹撮痛。倍沒藥。

黑神散。治產後惡露不盡。或胎衣不下。血氣攻冲。心腹痞滿。或

膽腹堅脹撮痛反血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾

當歸

芍藥

熟地黃

乾薑炮

桂心

蒲黃

甘草

炙各四兩

黑豆

炒去皮半斤

右為細末每服二錢酒童便各半盞同煎調服○墨氏曰墨神散寒多及秋冬者宜之若性急形瘦及夏月宜審之

紅花散 治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉

牡丹皮

川歸

紅花

蒲黃

炒各等分

右為細末每服半兩酒煎和渣溫服○如胎衣不下榆白皮湯

調半兩立效

鹿角散

治產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角燒

灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒此物行血

乾荷葉善破血

神方也尤妙在服法

樹金燒存性為末每二錢燒醋一合調灌之立活

鬱金散 治產後血上冲心已死并下胎

鬱金燒存性爲末每二錢燒醋一合調灌之立活

治血鬱雜方

產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴瓶內煎熱醋沃之以瓶口對產婦鼻孔熏之卽醒

一方如覺暈卽以醋嗅面醒來仍與醋細細呷之又以醋塗口鼻并置醋子旁使常聞其氣

一方麒麟竭二兩細研爲末非時溫酒調下二錢

一方紅花一兩搗爲末分作二服酒二鍾煎取一鍾併服如口緊幹開灌之速效

一方用紅花三兩新者無灰酒重便各半升煮取一盞服之

用剉硝黃法
亦極安慎
之

一方用藕木三兩細剉水五升煮取二升分再服瘥無蘇木取紮

衣煮汁服之亦得以上俱破血輕劑

牡丹散治產後血暈悶絕口噤則擗開口灌之

牡丹皮 大黃煨 芒硝各一兩 冬瓜子牛合 桃仁三十個去皮尖

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去滓入硝又煎分二服

產書一方治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭硬及

寒熱不禁

接骨木破之如算子大握以水一升煎至半升分溫二服

或小便數惡血不止服之即痊此水煎三遍其力一般此是

起死之方以上二方俱重劑點滴不出者宜用

以上治惡血攻冲昏暈之劑

并林散治產後風虛血暈精神昏眩
神丹二兩
神丹二兩
神丹二兩

荆芥散。治產後風虛。血暈精神昏昧。

荆芥

一兩三錢

桃仁

炒五錢

右為細末。溫水調下三錢。微喘加杏仁。炒甘草各三錢。

一方。治產後血暈。用荆芥穗為末。童便調下二三錢。極妙。

一方。用多年陳荆芥穗。燈烟上燎焦黑。存性。每服三錢。童便少酒。

調下極妙。

一方。治產後血暈。身癱直戴眼。口角與目。外眦向上。牽急。不知人。

取雞子一枚。去殼取清。以荆芥末二錢。調服。仍依次調治。荆芥氣虛

人不
可服

○以上治風虛。血暈之劑。

倉公散。治產後血厥而冒。

按此乃肝熱
生風之候。由
血虛而肝急
也。然瘧直戴
眼。俱屬太陽
要知之。

取定法痰先
通其壅後補
其血也妙妙

瓜蒂

藜蘆

白礬各一分

雄黃半

右爲末每用少許吹鼻取嚏內服白薇湯

白薇湯治產後胃弱不食脈微多汗亡血發厥鬱冒等證

白薇

當歸各六錢

人參三錢

甘草一錢半

右切分作二帖水煎服

○以土治血脈之劑

○惡露不下

大全云夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾于宿令或產後當風取涼風冷棄虛而搏于血則壅滯不宜積蓄在內故惡露不下也

薛氏曰前證若惡露路不下用失笑散若氣滯血凝用花蕊石散

一產婦思則證服峻厲之藥惡露隨下久而後愈此以手或針其腹余曰此皮氣復通勿作前故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補

此產後溫行
正藥白芍藥
酒炒亦無妨

此以心神煩
悶故不用熱
藥而加童便
以引下

一產婦患前證服峻厲之藥惡露墮下久而昏憤以手護其腹余
曰此皮氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補
之而愈

起枕散 治產後惡血不行心腹及兒枕作痛甚危

當歸

白芍藥

酒炒各三錢

川芎

二錢

官桂

玄胡索

牡丹皮

蒲黃

炒

五靈脂

炒

沒藥

各一錢

白芷

石劉水煎入童便空心服

荷葉散

治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉

二兩

鬼箭羽

桃仁

劉寄奴

蒲黃

各一兩

右為釐末每服三錢以童便一大盞薑三片生大黃一分槌碎

同煎至六分熱服

通瘀飲。治產後惡露不通。心慌昏沉。寒熱交攻。

歸尾

大黃 各三錢

白朮

木通 各一錢

紅花 五分

桃仁

三十箇 搗爛另入

右用水一碗。酒一小盞。煎三沸。入桃仁再煎一沸。溫服。

既用大黃。復用白朮。豈得已之心。加酒同煎。桃仁。后入。又治法之妙。

廣濟方。廢產後惡露不下。

川牛膝

大黃 各二兩

牡丹皮

當歸 各一兩半

芍藥

蒲黃

桂心 各一兩

右為末。以生地黄汁調酒服。方寸匕。日三服。血下愈。

保命集方。治婦人惡血不下。

當歸

芫花 炒等分

右為細末。每服三錢。酒調下。

此方寒熱並用。逐瘀而不峻。妙在為末。調生地黄汁。酒服。

芫花大毒。后酒之酌。

又用好酒。浸酒下。

及藥。白。生。後。惡。露。下。而。心。然。斷。絕。驟。作。寒。熱。臍。腹。百。脈。皆。

范種人書
酒之用
當歸
方寸分
西關下

又用好墨醋淬末童便酒下

沒藥丸

治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆

痛如錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜經絡

當歸

西

芍藥

桂心

各半兩

桃仁

去皮尖炒研

沒藥

研各二錢半

乾蟲

去翅足炒

水蛭

炒焦各三十枚

右爲末

醋糊丸

如豌豆大

醋湯下三丸

黑龍丹

見前胞衣不下

治惡血不下雜方

一方用蒲黃三兩炒水三升煮取一升頓服

一方用益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合溫服

重水蛭非萬不得已不敢用

一方用麻子五升酒一升浸一宿明旦去滓溫服一升不瘥再服一升

○血露不絕

大全云夫產後惡露不絕者由產後傷于經血虛損不足或分解之時惡血不盡在于腹中而臟腑挾于宿冷致氣血不調故令惡露淋漓不絕也

薛氏曰前證若肝氣熱而不能主血用六味地黃丸若肝氣虛而不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯若胃氣下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加味歸脾湯若肝經怒火而血不行用加味四物湯若氣血俱虛用十全大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸

以上諸方失
載當倣立齋
更方

產後惡露不絕
而此方用之

川芎

當歸

各等

分

產後忌芍藥
而此方用之
亦血崩者無
忌耳

有謂如豆汁
者溫紫黑者
熱又曰寒過
多者虛此方
不寒不熱不
燥故可通用

敗醬治多年
疑血產后諸
病腹痛則此
去故生新藥
也

芎歸加芍藥湯。治產後血崩。眩暈不知人事。

川芎

當歸

芍藥各等分

右咬咀。每服四錢。水煎熱服。○一方加黃芩白水。

加味四物湯。治產後血崩。如豆汁紫黑過多者。

川芎

當歸

芍藥

生地黃

蒲黃

阿膠

薊根

白芷

右水煎服。

一方。瘧產後七八日。惡露不止。

敗醬草

當歸各六分

芍藥

續斷各八分

川芎

竹茹

各四分

生地黃

炒乾十分

右細剉。以水二升。煮取八合。空心頓服。

○已土補虛之劑

加味四物湯 治產後月餘經血淋瀝不止此陷下者舉之也

當歸

川芎

白芍

熟地

白芷

升麻

各一錢

血餘灰

易入

右剉水煎服

余族弟婦產後半月離蓐過勞下血傾盆急以求救余用此藥一服立止其效如神

千金方 治產後惡血不盡或經月或半歲者

升麻三兩清酒五升煮取二升半分溫再服

○已上升提之劑

烏金散 治產後血迷血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹痼痛頭目

昏眩多汗無力及崩中下血不止

血不止來此方之妙不在

肉桂

赤芍

延胡索

鯉魚鱗各等分

延胡索

諸病皆從敗血不止來此方之妙不在止而在行行則歸經而止矣治崩者要得此言

妙在地黃為君

餘血瘀血也故用行法

麒麟竭 男子亂髮灰 松墨少醋 百草霜 當歸

肉桂 芎 延胡索 鯉魚鱗燒存性 各等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

一方治產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣息急

亂髮燒一兩 阿膠二兩 代赭石 乾薑名三兩 乾地黃四兩

馬蹄殼一個 燒 牛角五兩 酥炙

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心米飲下日一服

豆淋酒 治產後猶有餘血水氣者

黑豆五升熬令烟盡投磁器內以酒一斗淬之飲盡豆淋酒治汚血又能發表也

二味有_{上載}且守之能

蒲醋飲子

治新產壓血逐敗滋新此藥治血神效又非黑神散

之可比也月內每口一二服尤良及療一切惡露與血積

真蒲黃不拘多少熬米醋令稠和藥成膏每服一彈子大食

前醋湯化開服

一方用蒲黃二兩水煎頓服

一方療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶

薑黃爲末酒服方寸七日三四服

胡氏曰薑黃治惡露不止

○以上行汚血之劑

牡蠣散前產後惡露淋瀝不斷心悶短氣四肢之弱頭目昏重

五心煩熱面黃體瘦

當歸附片

續斷

艾葉

人參

五味子

牡蠣粉

川芎

熟地

茯苓

龍骨

牡蠣粉煨

川芎

熟地

茯苓

龍骨各二錢

當歸炒

續斷

艾葉

人參

五味子

地榆

各一錢

甘草五分

右剉分二帖。加生薑三片。棗一枚。水煎食前服。

○此收澁之劑。虛脫者宜用。

○血崩不止

陳氏曰。產後血崩者。何答曰。產後傷耗經脈。未得平復。勞役損重。致血暴崩。淋瀝不止。或因酸醢不節。傷蠱榮衛衰弱。亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。為難治。急服固經丸止之。

陳無擇評曰。血崩不是輕病。產後有此。是謂重傷。恐不止。酸醢不節。而能致之。多因驚憂。恚怒。臟氣不平。或產後服斷血藥早。

致惡血不消。鬱滿作堅。亦成崩中。固經丸。自難責效。不若大料
煮芎藭湯。加芍藥。候定。續次。隨證。諸藥。治之。為得。

薛氏曰。前證若血滯。小腹脹滿。用失笑散。血少。小腹虛痞。芎藭湯。
肝火血多行。加味逍遙散。脾鬱不統血。加味歸脾湯。脾氣虛不攝
血。補中益氣湯。厚味積熱傷血。清胃散。加槐花。風熱相搏傷血。四
君子。加防風。枳殼。

兒症在脾胃。
故用六君加
炮姜。
一產婦血崩。小腹脹痛。用破氣行血之劑。其崩如湧。四肢不收。惡
寒嘔吐。大便秘瀉。余用六君加炮姜。薑。四劑稍愈。又以十全大

補三十餘劑而痊。

一產婦血崩。因怒。其血如湧。仆地。口噤。目斜。手足抽搐。此肝經血
耗生風。余用六味丸料。一劑諸證悉退。但食少晡熱。佐以四君。柴

胡丹皮而愈。

芩歸加芍藥湯。治產後血崩眩暈。不知人事。

方見前惡露不絕。

加味四物湯。治產後血崩如豆汁紫黑過多者。

方見前惡露不絕。

奇效四物湯。治產後血崩素有熱者。

方見血崩門。

乾熟地黃散。治產後崩中頭目旋暈神思昏迷四肢煩亂。不知

人事。

崩久虛脫者宜之。

熟乾地黃 黃芩 伏龍肝 赤石脂 各一兩 當歸 七錢半

川芎 阿膠 艾葉 白朮 人參 甘草 各半兩

一振固血不
用補氣猶妙
有鹿茸謂其
能引血上升
也

右吹咀每服四錢生薑三片水煎溫服

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂 續斷 川芎 當歸 丹參

甘草 龍骨 鹿茸 烏賊魚骨 鼈甲

右為細末煉蜜丸如桐子大空心溫酒下二三十丸

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如湧泉

瑞蓮 棕櫚 當歸 官桂 檳榔

川芎 魚鱗 亦燒灰用

右為細末每服三錢煨生薑酒調服如未止更進一服或非時

血崩無藥可治但進三服即止

固經丸 治產後血氣未復而有房事及勞役傷損致血暴崩或

溫滋之劑

艾葉

赤石脂 煨補骨脂 炒木賊 各半 附子 一枚 炮

濕瀝之劑固
脫以煖下元

此方惟心氣
鬱者宜之

淋瀝不止

艾葉

赤石脂

煨補骨脂

炒木賊各半

附子一枚

炮去皮

右爲細末糊丸桐子大每服二十丸溫酒或米飲下

千金方

治產後崩中下血不止

菖蒲一兩半剉酒二鍾煎一鍾去渣分三服食前下

心痛

大全云產後心痛爲陰血虧損隨火上冲心絡名曰心胞絡痛宜

大岩蜜湯治之若寒傷心經名曰真心痛朝發夕死夕發朝死無

藥可救

薛氏曰前證若陽氣虛寒用岩蜜湯溫之瘀血上冲用失笑散散

之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡心腹作痛以手按之却

心痛曰產後
則與尋常之
病不同矣當
于血分求之

不痛此血虛也須用補養之劑

一產婦患前證昏憤口噤冷汗不止手足厥逆用六君子加附子

一錢以廻其陽二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而安

一產婦患前證手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日復

痛亦用前藥而安

一產婦患前證用大黃等藥其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日

昏憤自以兩手堅護其腹不得診脈視其面而色青白余謂脾氣虛

寒而痛也用六君子湯加薑桂而痛止又用八珍湯加薑桂而安

大岩蜜湯一名桂心湯治素有宿寒因產大虛寒搏于血血凝不散

上冲心之絡脈故作心痛

熟地黄 當歸酒炒 獨活 吳茱萸炒 白芍炒

右剉水煎服○或云熟地黄泥隔安能去痛公同生乾地黄

乾薑

桂心不見

小草各一錢

細辛

甘草各五分

右剉水煎服。或云熟地黄泥隔安能去痛合用。生乾地黄。

失笑散。

治產後惡血上攻。心腹疼痛欲死。及兒枕痛。或牙關緊。

急。服可愈。

蒲黃

炒

五靈

錢各一

右為細末。作一服。

醋調膏。水一盞煎服。

金黃散。

治惡血上

心腹作痛。或發熱作渴。

延胡索

蒲黃

錢各二

桂心二分

右為末。酒調服。

火龍散。

治產後氣滯心痛。

茴香

炒

川練

炒各一兩

芫葉

鹽炒半兩

右為末。水煎服。

伏龍肝散。

治產後惡物不出。止攻心痛。

齊集綱目

卷之十一 心痛

三

狗胆能破瘀
血用桂心更
治絕悶妙

按腹痛原文
尚有數症曰
因氣滯用玄
胡索散因外
寒用五積散
因怒氣用四
物加木香柴

赤伏龍肝研細每服三五錢溫酒調下瀉出惡物立止

一方治產後惡血冲心痛氣悶欲絕

用桂心三兩搗為細末狗胆汁和凡如櫻桃大每服二丸熱酒調下不拘時

一方治產後血不盡心腹痛

荷葉炒令香為末水煎下方寸匕

○腹痛並小腹痛

薛氏曰產後小腹作痛俗名兒枕塊用失笑散行散之○若惡露既去而仍痛用四神散調之若不應用八珍湯○若痛而惡心或欲作嘔用六君子湯○若痛而泄瀉用六君子湯送四神丸○若泄瀉痛而後或後重用補中益氣湯送四神丸○若胸膈飽脹

以消導若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡

胡因陽氣虛弱用四君當歸炮姜因脾虛血弱用六君當歸炮姜發渴惡屬血虛用白虎宜慎東垣云血虛忌白虎因寔成虛因虛後補當與勿當鑒者病者兩責之幸勿誤也

惡食吞酸或脘痛手不可按此是飲食所致用二陳加山查白朮以消道若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡寒欲嘔等證此是中氣破傷宜補脾胃為主○若發熱腹痛按之痛甚不惡食不吞酸此是瘀血停滯用失笑散消之○若止是發熱頭痛或兼腹痛按之却不痛此屬血虛用四物加炮薑參朮以補之○如發渴用白虎氣弱用黃耆血刺痛則用當歸腹中痛則加芍藥宜詳察脈證而用之

一產婦腹痛發熱氣口脈大余以為飲食停滯不信乃破血補虛反寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜始悔問余曰何也余曰此脾胃虛之變證也法當溫補遂用六君子加炮薑二錢肉桂木香各一錢四劑諸症悉退再則補中益氣

之劑元氣遂復

齒唇因虛置
以脹症參之

一婦人產後腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘懷抱欠鬱
患齒唇沫而盜汗如竟夜不敢寐神思消燼余曰氣血虛而有
熱用當歸六黃湯內茜芩黃蘗炒黑二劑汗頓止再劑全止乃用
歸脾湯八珍散兼服元氣漸復而愈

一產婦小腹作痛服行氣破血之藥不效其脈洪數此瘀血內潰
為膿也以瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下膿而愈產後多有
此病縱非癰用之更效

注意

一產婦小腹痛小便不利用薤白仁湯二劑痛止更以四物加紅
花桃仁下瘀血而愈六抵此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致
若脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊乃瘀血下之即愈若腹

脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟鑒丸太乙膏及托裏散

一產婦小腹有痛有塊脈花而瀉以四物加玄胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈

一婦產後小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多為敗證

覺右有塊是寒氣乘虛而聚非真實症也不然何以羊肉熱地愈哉

一婦人寒月中產後腹大痛覺有塊百方不治一人教以羊肉四兩熟地黄二兩生薑一兩水煎服之三次愈

大全云兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臍風冷使血凝滯在于小腹不能流通則令

既曰惡露不
只不大便而
躁熱矣然不
用桃仁承氣
而用大承氣
者何蓋熱結
在膀胱故宜
大承氣也

結聚疼痛名之曰兒枕

金匱云產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之熱則裏結在膀胱也

大全云產後惡血雖常通行或因外感五邪內傷七氣致令斬然而止餘血壅滯所下不盡故令腹痛當審其因而治之

一產婦小腹痛甚牙關緊急此瘀血內停瀉以失笑散下血而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

一婦人經水來比常度過多不止遂用瀉藥止之致腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈

以上數段言惡露不盡

實執言惡露以無太陽證句及熱結膀胱句玩之便得其意彼

寒疝大全云。產後臍虛痛。乃冷氣乘虛。用當歸建中湯。無擇曰。產當寒月入門。臍下痛。手不可近者。羊肉湯。立齋曰。前症若脾胃虛寒。邪侵者。蟠葱散若肝經濕熱。小便不利者。瀉肝湯。

余按金匱所治。重在傷寒。裏實不重。在惡露。故其脹證。皆指實熱言。當以無太陽證。句。及熱結膀胱。句。玩之。便得其意。後案專主惡露言。故與前方不同。不可一律看也。

大全云。以惡露不盡。腹痛及兒枕。心腹刺痛。小腹痛。疼痛。寒疝。分爲四門。由母胎中宿有血塊。產後不與兒俱下。而仍在腹作痛。謂之兒枕。其惡露下不快。而作痛者。胎中原無積聚。不爲兒枕也。若惡露已盡。或由他故腹痛。如仲景枳實芍藥散證。或由血虛腹痛。如仲景當歸生薑羊肉湯證。自當別論。故復臚列諸名方于後。若服枳實芍藥散不愈。仍當求責瘀血也。故下瘀血諸方附焉。而補虛諸方。終之不復。立寒疝條。

加味四物湯。

治產後惡露不盡腹痛。

亦所當知母
膠二也

此所加六種
藥少有差等
宜自擇之

桂心血竭治
血痕妙

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 香附炒
各一錢

五靈脂炒二味另為末各一錢臨服調入

右剉一服水煎服○痛甚者加桃仁泥四分

海藏方四物湯加玄胡索沒藥白芷治產後敗血作痛

一方四物湯加苦棟 一方四物湯加玄胡索

一方四物湯加蒲黃

當歸蒲延散 治產後血痕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體

倦

當歸八分 桂心 芍藥炒 一血竭 蒲黃炒各六分

延胡索炒四分

右為末每服二錢空心酒調下

右為未每服二錢空心酒調下

玄胡索散。治產後惡血攻刺腹痛及一切血氣刺痛不論新舊

虛實皆可服之。

當歸酒

玄胡索

赤芍藥

蒲黃隔紙炒

桂皮

乳香

沒藥各等分

右研為細末每服三錢溫酒調空心服。

延胡散。治產後見枕腹痛。

延胡索

當歸各一兩

赤芍五錢

肉桂七錢半

蒲黃炒

更加紅藍琥
珀治見枕猶
妙

琥珀各二錢半

紅藍花二錢

右為末每服二錢童便合酒調食前服。

烏金散。治惡露敗血走刺心腹見枕痛坐臥不得餘血不快。

燒川芎用黑
附者溫血海

川芎

七錢半燒然
蓋罇中存性

黑附子

半枚炮
去皮齋

之畏也

右為細末。每三錢薑便和酒調服。痛止血。下方住服。

地黃散。治產後惡血不盡。腹中疴痛。

生地黃炒 當歸炒各一兩

生薑五錢切碎新瓦上炒令焦黑

右為細末。薑酒調下二錢。空心服。一方加蒲黃為丸。

四神散。治產後瘀血不消。積聚不散。作塊。心腹切痛。

當歸 乾薑炮 川芎 赤芍炒各等分

右為末。每服二錢。溫酒調下。

黑神散。治產後血塊痛。

熟地黃一斤 陳生薑半斤

右二味。拌勻。同炒乾。為末。每服二錢。烏梅湯調下。常服酒調。

丹邊方。治產後血塊痛發熱。

右研細分五帖。豆淋酒下之。食前服。

丹... 治產後血塊痛... 治產後血塊痛... 治產後血塊痛...

五靈脂四錢 炒 牡丹皮 沒藥 滑石

右研細分五帖豆淋酒下之食前服

卷荷散 治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡露不快並皆

治之

初出卷荷 紅花 當歸各一兩 蒲黃紙炒 牡丹皮各半兩

右為細末每服三錢空心鹽酒調下

荷葉散 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩 劉寄奴 蒲黃各一兩 桃仁去皮尖炒半兩

右吹咀每服四錢童子小便一盞生薑三片生大黃一分煎至

六分熱服不拘時○一方有鬼箭羽

隱居澤蘭湯 治產後惡露腹痛或胸滿少氣

均是破血藥而治煩悶之症則童便生地猶佳

澤蘭理血氣
聖藥

澤蘭炒

生地黃

當歸

芍藥炒

生薑各錢

甘草五分

大棗四箇

右剉水煎服。

又方。治產後下血不盡腹內堅痛不可忍。

當歸

芍藥

桂心各三兩

桃仁一百二十粒製

右水六升煮二升溫分二服未差加大黃。

又方。治產後惡露不盡結聚小腹疼痛。

當歸七錢半

香附子製一兩

赤芍

青皮

木香

桂心

琥珀

沒藥各半兩

右為細末以烏豆淋酒調服二錢。

產寶湯。

治產後餘血作痛兼塊者。

妙在加大黃
然以醋製者
佳

延胡索一名三聖散
治產後臍下痛並腰疼

產後餘血作痛 兼鬼者

桂心 薑黃各等分 右為細末酒調方寸七血下盡妙

延胡索一名三聖散一名如神湯 治產後臍下痛並腰疼

延胡索 桂心各半 當歸一兩 右為細末熱酒調下二錢

香桂散 治產後臍下疼痛不止

當歸 川芎各二錢半 桂心半兩

右為細末分為三服每服酒一盞煎三五沸更入童便少許煎至七分溫服甚者不過再服即瘥

當歸血竭丸 治產後惡露不盡結聚成塊心膈痞悶及臍下堅痛

當歸 血竭 芍藥 蓬朮炮各二兩 五靈脂四兩

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十丸食煎溫酒送下

破血為主

凡產後脚腰疼痛屬於血
流注者今人
不知往往誤
治而以大補
為王遂至日
久不治或
有風寒襲之
皆亦不可以
補也此方行
於最巨云風
未善別宜簡
擇
產後瘀血要
藥即失笑散
之變

當歸養血丸 治產後惡血不散發渴心腹疼痛及惡露不快臍

下急痛連及腰脚疼痛

當歸

赤芍

牡丹皮

延胡

各二兩

桂心

一兩

右為末煉蜜丸如桐子大空心酒下三四十丸痛甚者細嚼下

紫金丸

治產後惡露不快腰腹小腹如刺時作寒熱頭痛不能

飲食亦治久有瘀血月水不調亦可療心痛

五靈脂

小洗去上石
焙乾炒為末

真蒲黃

各等分

右以好米醋調五靈脂慢火熬成膏次以蒲黃末搜和丸如櫻

桃大每服一丸水與薑便各半盞煎至七分合藥化溫服之少

頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月信不和者並用酒磨下

玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛大便燥結時發寒熱

此河間法也
四物合承氣
主之益鹹走
血之意

一貴內產后
脈沉小如絲
腹痛不能食
聞藥則嘔以
此方三服而
愈
此仲景方也
又為經少不
利要藥
豚肝者即乾

當歸 川芎 赤芍 熟地 大黃 朴硝 甘草 冬二錢半

右作一服水煎食前溫服○諸方治敗血作痛皆是溫劑熱則流通之理惟此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結者設也非大便秘結者慎不可用

枳實芍藥散 金匱云產後腹痛煩滿不得卧此方主之

枳實 炒令黑 勿太過 芍藥 各等分

右杵為散服方寸匕日三服並主癰膿以麥粥下之

下瘀血湯 產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹

中有乾血着臍下宜此方

大黃 兩 桃仁 二十枚 蟅蟲 二十枚 炒去足

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之

血之下也新
血二字非

新血下如豚肝

保命方。治血暈。血結或聚于胸中。或偏于小腹。或連于脇肋。四
物湯四兩。倍當歸。川芎。加鬼箭羽。紅花。延胡。各二兩。同為釐末。
加下四味。煎調沒藥散服。

蠶蟲二錢去翅足炒

水蛭一錢炒

麝香少許

沒藥

石為末。入前藥調服。血下痛止。則服一服。

千金桃仁芍藥湯。治產後腹痛。

桃仁

芍藥

川芎

當歸

桂心

乾漆碎炒

甘草各二兩

右細切。水八升。煮二升半。分三服。

○以上治瘀血腹痛之劑。皆重劑。宜斟酌用之。

但看小腹急痛為異

增損四物湯。治產後陰陽不和。在寒在熱。惡露停滯。亦令寒熱。

但看小腹急痛為異。

當歸酒。白芍。川芎。人參各一。甘草炙半。

乾薑二兩。

右咬咀。每服四錢。薑三片。水煎。無時熱服。

獨聖散。治產後血虛腹痛。

當歸一味。為細丸。每服二錢。水一盞。煎七分。溫服。

當歸散。治產後陰血虛弱。或氣滯血凝。以致發熱腹痛。或腹脇

脹滿。

當歸。乾薑各等分。

右剉。每服三錢。水煎服。

此方簡易。自
有獨見。而當
歸又能治酒。
酒寒熱不已。

定痛散。治產後惡血不止。

當歸

芍藥炒各二錢

肉桂一錢

右切作一服。水酒各一盞半。加生薑五片。煎一盞服。

當歸建中湯。治婦人產後虛羸不足。腹中刺痛。不止。吸吸少氣。

或苦小腹中急痛。引腰背不能飲食。

當歸

四兩

芍藥

炒六兩

桂枝

三兩

甘草

炙二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右六味以水一斗。煮取三升。分溫三服。一日令盡。若大虛。加

飴糖六兩。湯成內干火上煖。令飴消。若去血過多。崩傷內血。

不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八味湯內。阿膠服之。

羊肉湯。治產婦脾虛為寒邪所乘。以致腹痛。及寒月生產寒氣。

血不止。加地黃阿膠。似矣。但本方有桂枝。生薑。得无太熱。請酌之。

入于產門。腹下脹。滿。手不可伸。當歸。川芎。各半。生薑。兩。

元太執事請
羊肉湯
治產婦脾虛為寒邪所乘以致腹痛及寒月生產寒氣

入于產門。臍下脹滿。手不可犯。

精羯羊肉

四兩

當歸

川芎

各半兩

生薑

一兩

右以水十盞。酒三盞。煎至四盞。分四次空心服。加葱鹽亦可。

衍義云。一婦人產當寒月。寒氣入產門。臍下脹痛。手不得犯。此

寒疝也。醫當治之。以抵當湯。謂其有瘀血耳。予教之曰。非其治

也。可服張仲景羊肉湯。少減作二服愈。

千金方。治產後餘疾。腹中絞痛。瘦乏不下食。

當歸

黃芪

芍藥

各六錢

乾地黄

白朮

各八分

桂心

甘草

各四分

大棗

十枚

右咬咀。水二升。煮八合。空心服。忌生冷。

○以上治虛寒腹痛之劑。

與前增損四
物湯相上下
用者當合視
之

生料五積散。治產後內有餘血。外感寒邪。相搏而腹痛。

蒼朮 二錢四分

麻黃 去根節

橘紅

枳殼 各六錢

桔梗 一錢二分

厚朴

乾薑 炮各四錢

當歸

白芍

川芎

白茯苓

半夏

白芷

肉桂

甘草 炙各三分

右加薑葱米煎服。

○右方治寒邪腹痛之劑。非真受寒氣者不可輕用。

○脇脹痛

脇脹痛由膀胱停水所致。是何見解。用何湯藥。宜考。

大全云。產後兩脇脹滿。氣痛。由膀胱宿有停水。因產後惡露不下。

盡水壅痞。與氣相搏。積在膀胱。故令脇肋脹滿。氣與水相激。故令

痛也。

玄胡索散見前腹痛條。

薛氏曰。前症若肝經血瘀。用玄胡索散。若肝經氣滯。用四君子小

之異故治不能生肝。用六味丸。若白肺金勢盛。剋制肝木。用瀉白湯。仍

但屬肝經而柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用八珍此柴胡若腎水不足不能生肝用六味丸皆肺金勢盛剋制肝木用瀉白湯仍同之異故治不

參前論主之

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施功而反助其脹矣

乾地黃湯治產後兩脇滿痛兼除百病

乾地黃

芍藥各三兩

當歸

蒲黃各二兩

桂心六兩

甘草一兩

生薑五兩

大棗二十枚

右咬咀以水一斗煮取二升半分服日三

肝謂木得桂而積故用之以治脇痛然不可不審寒執虛實也此方以桂心為君而以血藥為輔用之以溫肝家血寒之病則可用之以治肝

火伯而則不
可須註解之
生美然亦
氣滯二字盡
之

經效方

治產後肝經氣滯不平脇脹腹痛或寒熱往來內熱瞞

熱

當歸一錢半

芍藥炒

苦梗

枳榔

枳殼炒各八分

桂心

青木香

柴胡各六分

右剉水煎服

蘇葛湯

療產後惡露不下血氣壅痞脇脹痛不下食

蘇木

紫葛各十分二分

芍藥

當歸各八分

桂心

蒲黃各六分

生地黄汁三合

右咬咀以水二升煎七合下蒲黃分兩服

經效方

理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥八分

當歸六分

延胡索

蒲黃各四分

荷葉帶炙三枚

行血為主

行血為主

芍藥八

當歸六

延胡索

蒲黃各四

尚藥帶後三

右水二升煎取八合後入蒲黃空心分二服

當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸 乾薑各等分

右為末酒服三錢水煎入鹽醋少許食前熱服方酒煎

麋濟方 療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

厚朴八分 人參 當歸 茯苓 甘草各

陳皮 生薑各四分

右咬咀以水二升煎取八合去滓分溫服

抵聖湯 治產後腹脇悶滿或嘔吐者

赤芍 半夏 澤蘭葉 陳皮 人參 甘草各等分

右咬咀每服四錢薑五片水煎溫服

此方治氣血虛滯脾胃不足者尤宜

以上七方並无川芎腹脇痛者不宜與要知此脉此

理

漢陰經

卷十一

三

腰痛

大全云。腎主腰脚。產後腰痛者。為女人腎位。繫于胞產。則勞傷腎氣。損動胞絡。虛未平復。而風冷客之。冷氣乘腰。故令腰痛也。若寒冷邪氣。連滯背脊。則痛久未已。後忽有娠。必致損動。蓋胞絡屬腎。腎主腰故也。

薛氏曰。前證真氣虛邪乘之者。用當歸黃芪湯。或十全大補湯。為主佐。以寄生湯。如不應。用十全大補加附子。

一產婦。腰痛腹脹。善噫。諸藥皆嘔。余以為脾虛血弱。用白朮一味。炒黃。每劑一兩。米泔煎。飲時匙許。四劑後。漸安。百餘劑而愈。

當歸黃芪湯。治產後失血過多。腰痛身熱自汗。

諸藥皆嘔。但用白水而分兩煎。法服法皆妙。

當歸一兩

黃芪

白朮

炒各二兩

右咬咀。每服六錢。加生薑五片。水一盞半。煎至一盞。溫服。不拘

時。

玄胡四物湯。治血癖腹痛及血刺腰痛。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄

各七錢半

玄胡索

水煮兩

右為細末。每服三錢。酒調下。

如神湯。治產後瘀血腰痛。

延胡索

當歸

桂心

各等分

右水煎服。

又如神湯

即主料五積散加桃仁

逐敗血去風濕。

五積散。方見前。腹痛條。

廣濟方。

治產後虛冷。血氣流入腰腿痛不可轉。

敗醬

當歸

川芎

芍藥

桂心

各六分

血凝者。其難惜敗。更難。

竟也

此方治久痛
之因外感者

右咬咀水二升煮取八合分溫二服忌葱

寄生防風湯 治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沉重行步

艱難

濁活

川芎

芍藥炒黃

桂心

續斷

生薑

桑寄生各六分

當歸

防風各八分

右剉水煎服

桃仁湯 治產後惡露方行忽然漸少斷續不來腰中重痛或流

注兩股痛如錐刺此由血滯于經絡不即通之必作瘕瘕宜桃

仁湯恐有瘕者預服五香連翹湯

桃仁去皮尖

蘇木

生地各半兩

蟲蟲去翅足炒

水

蛭炒各三

右每服三錢水煎空心熱服惡露下即住服

既為瘀血何

五香連翹湯

丁香

沉香

乳香

射香

升麻

既為瘀血何
以只用五香
行氣益為病
血于氣也
射香分兩想
誤

五香連翹湯 治產後瘀血腰痛作瘕

木香

丁香

沉香

乳香

射香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

木通

各二兩

右為觔末每服五錢水煎入竹瀝少許服

○頭痛

大全云夫頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛冒氣虧弱飲食不克穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上蹙于頭陽實陰虛則令頭痛也○又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳

薛氏曰前證若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

以風寒所傷
而用補中益
氣尚須斟酌

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味九加五味子兩月而瘥

郭茂恂嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間每頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓臂血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已眾醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服乃瞑目寢如平時至清晨下一行約三升許如蝗蟲子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣此中咬痛也不如用殺虫藥更神效

黑龍丹見胞衣不下條

一奇散即芎歸湯治產後血虛頭痛

右為細末每服一錢水一盞煎七分溫服

服法佳

當歸

川芎各二錢半

右爲細末每服一錢水一盞煎七分溫服

芳烏散。治產後氣滯頭痛。

天台烏藥

大川芎

各等分

右爲細末每服三錢燒紅秤鍾淬酒調服

青附散。治產後氣虛頭痛及敗血作梗頭痛諸藥不效者。

川芎

雨

大附子

一箇去皮臍切四片拌醋一
碗炙附子蘸醋盡爲度

右爲末每服二錢清茶調服。

加減四物湯。治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛。

蒼朮

一雨大錢

羌活

川芎

防風

香附

炒

白芷

各一雨

石羔

二雨半

細辛

一雨半

當歸

甘草

各五錢

承會綱目

卷十一

頭痛

三

產後頭痛至
于內虛正治
也求之瘀血
變注也似瘀
血而非瘀血
反下如蝗虫

子者怪也。若痰癖寒厥氣虛則又看之雜症矣。經曰有者求之無者求之。豈可執一哉。如當知經斯為上工矣。
氣弱血滯之痛不可作傷人治是去而血虛風寒之痛乃不論及何也。詳后五積散方即是按法甚妙。

右劉每服一兩水煎服無時。如有汗者知氣虛頭痛也。加芍藥三兩桂一兩半生薑煎。如熱痰頭痛加白芷三兩石膏三兩知母二兩。如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑三片煎服。

○遍身疼痛

大全云產後遍身疼痛者何。答曰產後百節開張血脈流散遇氣弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脈急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也。若鑒以為傷寒治之則汗出而筋脈動惕手足厥冷變生他證。但服趁痛散除之。薛氏曰前證若以手按而痛甚者是血滯也用四物炮薑紅花桃仁澤蘭補而散之。若按而痛稍緩是血虛也用四物炮薑人參白朮

補而養之。

一產婦身腹作痛發熱。不食煩躁不寐。盜汗脇痛。服解散祛血之藥。不時昏僵。六脈洪大如無。用補中益氣加炮薑半夏一劑。頓退二三。又劑寢食甘美。但背強而痛。用八珍散大補湯調理而安。一產婦遍身頭頂作痛。惡寒拘急。脈浮緊。此風寒之證也。用五積散一劑。汗出而愈。但倦怠發熱。此邪風去而真氣虛也。用八珍湯調理而痊。

一婦六月產後。多汗人倦。不敢袒被。故汗出被裏冷。則浸漬得風濕疼痛。遂以羌活續斷湯數服而愈。

趁痛散。治產後氣弱血滯。筋脈拘攣。腰背強直。遍身疼痛。

當歸

官桂

白朮

黃芪

獨活

牛膝

此方根氣弱
疼故用芪朮

若外感重者不可輕用

濟陰經

卷十一

三

生薑各五錢 甘草炙 芫白各三錢半

右咬咀每服五錢水煎服○加桑寄生半兩尤佳

五積散 治產後身痛兼感寒傷食

方見前腹痛條○與四物湯各半服之穩當

加味四物湯 治產後血虛身痛

當歸 川芎 人參 芍藥 熟地 白朮

乾薑炒各二錢 右剉作一服水煎服

大千方 治產後遍身青腫疼痛及眾疾

牛膝 大麥蘖名等分

右為細末以新瓦罐子中填二重麥蘖二重牛膝如此填滿用

鹽泥固濟火煨過赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下二

此專治血統諸經青腫作痛 只此四方類有法目之

脚氣

此此四方類
令人心賞

錢

脚氣

大全云。產後熱悶氣上。轉為脚氣者。何。答曰。產臥血虛生熱。復因
春夏取涼過多。地之蒸濕。因足履之。所以着為脚氣。其狀熱悶。掣
瘈驚悸。心煩嘔吐。氣上皆其候也。可服小續命湯。方見後兩三劑
必愈。若鑿者。誤以逐敗血藥攻之。則血去而疾愈增矣。中風條

陳無擇評曰。脚氣固是常病。未聞產後能轉為者。往讀千金。見產
婦多有此疾之語。便出是證。文辭害意。蓋可見矣。設是執悶氣上
如何。便服續命湯。此藥本主少陽經中風。非均治諸經脚氣。要須
依脚氣方論。陰陽經絡調之。此涉專門。未易輕論。既非產後要病。
更不繁引。

準繩云。陳無擇雖有此論。然小續命湯加減與之用無不效。故百

問云。寒中三陽所患必冷。小續命湯主之。加生薑汁更快暑中三陰所患

必熱。小續命湯。去附子減桂一半大煩躁者紫雪最良。予取百問中加減法庶使後人均得

治如無紫雪用真薄荷煎冷水嚥下。婁云諸方必與四物湯各半服之

薛氏曰。前證當補氣血為主。佐以小續命湯寄生湯。如不應。用大

防風湯。

一產婦患前證。或用獨活寄生湯。而痊後復作。服前湯其汗如水。

更加口噤吐痰。余用十全大補湯。倍養血氣。漸愈。後飲食日少。肌

體日瘦。吐痰如湧。此命門火衰。脾土虛寒。用八味丸。及加味歸脾

湯。諸證漸退。肌肉漸生。

獨活寄生湯。治肝腎虛弱。或久履濕冷之地。或洗足當風濕毒。

脚氣。

獨活寄生湯。治肝腎虛弱。或久履濕冷之地。或先足。或風濕。或骨節疼痛。或皮肉紫破。足膝攣重。又專治產後。

內攻。兩脰緩縱。攣痛痺弱。或皮肉紫破。足膝攣重。又專治產後脚氣。

川獨活兩三 桑寄生如無以續斷代 杜仲炒 牛膝去蘆酒浸

細辛 官桂不見火 白茯苓 防風

川芎 當歸 人參 熟地黄酒洗

芍藥 秦艽各二兩 甘草炙一兩

右咬咀。每服四錢。薑五片。水煎溫服。

大防風湯。治陰虛邪襲。腿膝腫痛等證。

防風 附子炮 牛膝酒浸 白朮炒 羌活 人參

肉桂 黃芪炒各一錢 川芎 熟地黄各一錢 芍藥炒

杜仲姜汁炒 甘草炙各五分

按二方俱小續命湯變法。但去麻黃而佐四物是不舍產後二字。

右劉冰煎服

甘草

卷之十一終

肉桂

黃芪

川芎

熟地

白朮

茯苓

劉風

劉子

平熱

白朮

黃芪

人參

大劉風

劉子

平熱

白朮

黃芪

人參

奇效則得劉四益壽王六水煎服

藥

蔡氏

齊二

甘草

人參

黃芪

瓜

當歸

人參

黃芪

熟地

白朮

喘

宮

山

黃芪

熟地

白朮

川

桑

無

林

黃芪

熟地

調

肉

桂

白

黃

芪

開中

武之望叔卿父輯著

武林

朱長春秉年父訂正

濟陰綱目卷之十二

關中 武之望叔卿父輯著 武林 朱長春秉年父訂正

西陵 汪 淇懽漪子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

外感風寒

寒熱似瘧
瘧不歇是昌
下數項文消
息酌用

嘆驚語

李氏曰。產後外感。離牀太早。或換衣襲風。冷入下部。令人寒熱似瘧。頭疼不歇。血虛者。芎歸湯加人參。紫蘇。乾薑。血氣虛者。補虛湯加陳皮。乾薑。寒熱甚者。熟料五積散。熱不止者。黃龍湯主之。如體盛發熱惡寒及瘧痢者。小柴胡湯合四君子。四物湯加黃芩。各三分。散切。不可以傷寒治法。若誤服熱藥過多。熱證大見。久而便閉者。柴胡破瘀湯。或四物湯加大黃。芒硝。暫服。即調補之。

良方曰。產後外感風寒。發熱頭痛。身疼。雖如傷寒。時氣。當用麻黃。

以嘔加地黃
宜酌用

亦不可輕易如早起勞動為寒所傷則淅淅惡寒翕翕發熱頭項
肩背骨節皆痛至七八日乃差若大便堅作嘔不能食用小柴胡
湯加生薑地黃

大虛癰症

吳氏曰新產後患傷寒不可輕易發汗蓋有產時傷力發熱去血
過多發熱惡露不去發熱三日蒸乳發熱或有早起勞動飲食停
滯一皆發熱狀類傷寒要在仔細詳辨切不可輒便發汗大抵產
後大血空虛若汗之則變心惕肉瞤或鬱冒昏迷而不省或風摘
搦而不定或大便閉澀而難去其害非輕切宜詳審凡有發熱且
與四物湯以川芎當歸為君最多白芍藥須炒過酒蒸熟地黃佐
之如發熱加軟苗柴胡人參乾薑炮之最効蓋乾薑之辛熱能引
血藥入血分氣藥入氣分也且能去惡養新有陽生陰長之道以

未盡者益母丸黑神散必兼用之若胃虛少食者必加白朮茯苓

血藥入血分。氣藥入氣分也。且能去惡養新。有陽生陰長之道。以

熱治熱。深合內經之旨。予嘗用之。取効如神。故錄以勸。如有惡露未盡者。益母丸黑神散。必兼用之。若胃虛少食者。必加白朮茯苓。有痰嘔逆者。必加陳皮半夏。其餘六經各條治例。皆同。但藥中必加四物湯為主。乃養血務本之要也。

等分法乃善守法

大全云。凡產後發熱頭痛身疼。不可便作感冒治之。此等多是血虛。或敗血作梗。宜以平和之劑與服。必効。如玉露散。或四物湯。加北柴胡等分煎服。若便以小柴胡湯及竹葉石膏湯之類。竟不救者。多矣。

仲景所謂中風。即今人所謂傷風。陽旦湯者。從仲景方也。

產後中風。數十日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出。雖多陽旦證耳。可與陽旦湯。即桂枝湯。方見傷寒。加味芎歸湯。治產後血氣虛。外感風寒。頭疼。增寒壯熱。

當歸

川芎

各二錢

人參

紫蘇

乾葛

各一錢

右剉加生薑三片水煎服。

以竹葉乾葛

竹葉湯。

治產後中風發熱面赤喘而頭痛。

竹葉

一把

葛根

三兩

防風

桔梗

桂枝

人參

甘草

各一兩

右咬咀每服五錢棗一枚薑五片水一盞半煎一盞去滓服溫。

覆使汗出若頭項強用大附子半錢煎藥揚去沫嘔者加半夏

一錢。

○中風

大全云夫產後中風者由產時傷動血氣勞損臟腑未會平復早

起勞動致使氣虛而風邪乘虛入之故風邪冷氣客于皮膚經絡

用附子亦須善
也此雖大法
參桂從中風
而喘也然不
用血藥而用
為君為面赤
須用斟酌

邪氣虛人外
因也若中藏
便不可治矣
即治亦須從

虛弱若人諸藏恍惚驚悸隨其所傷臟腑經絡而生病焉

本氣為主

但疼痺羸之。不任少氣。太凡筋脉挾寒。則攣急。喎僻挾濕。則縱緩。虛弱若入諸藏。恍惚驚悸。隨其所傷。腑臟經絡而生病焉。

郭稽中論曰。產後中風者。何答曰。產後五七日內。強力下床。或一月之內。傷子房室。或懷憂怒。擾盪冲和。或因食生硬。傷動藏府。得病之初。眼澀口噤。肌肉攣搐。漸至腰脊筋急。強直者。不可治。此乃人作。非偶爾中風所得也。

薛氏曰。前證果外邪所屬。形氣不足。病氣有餘。當補元氣為主。稍佐以治病之藥。若強力不休。月內入房。屬形氣俱不足。當純補元氣。多有復甦者。若誤投風藥。乃促其危也。

丹溪曰。產後中風。口眼喎斜。必用大補氣血。然後治痰。當以左右手脉。分其氣血多少。以治切。不可作中風治。而用小續命湯。及發

表治風之藥

大全云。產後下血過多。虛極生風者。何答曰。婦人以榮血為主。因產血下太多。氣無所主。唇青肉冷。汗出目眩。神昏。命在須臾者。此虛極生風也。宜急服濟危上丹。若以風藥治之。則誤矣。

薛氏曰。前證若心脾血氣俱虛。用大補湯。如不應。加附子。鈞藤。鈞。若肝經血虛。用逍遙散。加鈞藤。經云。脾之榮在唇。心之液在汗。若心脾二藏虛極。急用參附湯救之。

鈞藤是肝經
風熱藥。附子
是脾腎虛寒
藥。豈並行不
悖乎。

一婦人患前證。用諸補劑。四肢逆冷。自汗泄瀉。腸鳴腹痛。余以陽氣虛寒。用六君子加薑附各五錢。不應。以參附各一兩。始應。良久不服。仍腸鳴腹痛。復灸關元穴百餘壯。及服十全大補湯方效。大全云。產後中風口噤者。是血氣虛而風入于頰頰夾口之筋也。

反張在背屬太陽及督脉二經設果爲風所中不能續命等湯用四物不妨配用

手三陽之筋結入于頤。產則勞損藏腑傷于筋脉。風若乘之。其三陽之筋脉則偏持之。筋得風冷則急。故令口噤也。

大全云。產後角弓反張者是體虛受風。風入諸陽之經也。人之陰陽經絡周環于身。風邪乘虛入于諸陽之經。則腰背反折。攣急如角弓之狀也。

薛氏曰。前證因氣血耗損。腠理不密。汗出多多。而患者虛象也。宜固氣血爲主。佐以本方。丹溪曰。產後當大補氣血爲先。雖有他證。以未治之。如惡寒發熱等症。乃氣血虛甚之極也。宜大劑參耆歸木肉桂以培養之。如不應。急用炮附子。再不應。用人參一兩。炮附子二三錢。各參附湯。倘有未應。乃藥力未能及也。宜多用之。

小續命湯。治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或口眼喎斜。牙

大全云。產後中風口噤者是血氣虛而風入于頤頰夾口之筋也。

關緊急角弓反張。

防風

錢一

麻黃

去節

黃芩

芍藥

人參

川芎

防已

肉桂

各七

附子

炮

杏仁

未皮

甘草

炙四

分

右剉加生薑水煎溫服。有熱去附子減桂一半。有汗去麻

黃加乾葛。骨節煩疼去附子加芍藥。精神恍惚加茯神遠

志。煩心多驚加犀角。嘔逆腹脹加人參半夏。骨間疼痛

加附子官桂。臟寒下痢去防風黃芩加附子白朮。煩悶大

便澀去附子加芍藥入竹瀝。盛冬初春去黃芩。

華陀愈風散。

治產後中風口噤牙關緊急手足瘳癱如角弓狀

亦治產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死此

藥清神氣通血脈其効如神。

原不寒不熱

行爲未每服三錢黑豆碎酒調服或童子小便亦可口噤者搗

荆芥氣味辛
涼不寒不熱
散不傷氣行
不害和且理
血分風邪調
以豆酒或童
便祛風降火
妙不可言誠
產後血暈神
方也

荆芥穗畧焙 情迷方加當歸等分

石為末每服三錢黑豆滓酒調服或童子小便亦可口噤者搗
開灌之或吹鼻中皆効李時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧
珙集驗方以酒服各如聖散藥下可立効陳氏方名舉卿古拜
散蕭存敬方用古老錢煎湯服各一捻金許叔微本事方云此
藥委有奇効神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不
省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之
果然皆効唐寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草
受風而成宜服此藥也戴氏證治要訣名獨行散賈似道悅生
隨抄呼為再生丹

血風湯 治產後諸風變急或痰弱無力

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎

芍藥 當歸 熟地 白朮 茯苓各等分

右為細末每服三錢溫酒調服一半煉密丸如桐子大每服五

七十九溫酒下

防風湯 治產後中風背項強急胸滿氣短

防風 獨活各去蘆 葛根各五兩 當歸 人參

白芍 甘草炙各二兩

右咬咀每服八錢水一盞半棗二枚煎一盞溫服

雲岐方 產後中風半身手足不遂言語蹇澀恍惚多忘精神

不定

獨活 當歸 芍藥 防風 川芎

右咬咀以水八升煮取二升半分為三服覺效更作一劑又作

玄參

天麻錢五桂心錢三

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺効更作一劑又作

丸每服二十丸○如有熱加葛根五錢○有冷加白朮五錢○

有氣證加生薑一兩半○手足不遂加牛膝一錢半○革薢三錢○

黃耆四錢○腹痛加芍藥當歸各七錢半○不食加人參五錢○

玄參一兩○若寒中三陰所患必小續命湯加薑煎○若暑

中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂一半加薄荷煎○

防風羊角湯治產後氣血不足風邪所襲肢體攣痛背項強直○

防風兩

赤芍炒

桂心各半兩

羚羊角

川芎

羌活

當歸

酸棗仁炒

牛蒡子炒各

二錢

右剉每服四錢水煎服○

此治心肝二
經風藥也而
善羊桂心寒
熱不同乃古

人獨擅其長
用之達之存

乎其人

如繩束者拘

急收剔之象

靈脂硫黃須
製用生地汁
九妙

川芎散 治產後中風身背拘急有如繩束

川芎

羌活

羚羊角屑

酸棗仁

芍藥

炒黃各四兩

桑白皮

一兩

防風

去虛二兩二錢

右劉每服一兩水煎日進三服

濟危上丹

治產後去血過多氣無所主以致唇白肉冷汗出目

瞋神昏命在須臾此虛極生風也急服此藥若以風藥治之則

誤矣

乳香

五靈脂

硫黃

玄精石

以上各另研極細

阿膠

蛤粉

卷柏

生用

桑寄生

陳皮

去白等分

右將前四味同研勻入石臼內微火炒再研極細後入餘藥末

用生地黄汁丸如桐子大每服五十丸食前溫酒或當歸湯下

一味而治風

獨活去皮

大豆升

酒三

此方以獨活一味而治風則妙矣于治虛則未也五緩六急者陰緩而陽急也皆風寒所為故服法如此

雞糞入肝治汚濁之血豆

大豆紫湯。治產後風虛五緩六急手足頑麻氣血不調等證。

獨活去皮兩半 大豆半升 酒三升

右先用酒浸獨活煎二三沸別炒大豆令極熱焦烟出以酒沃之去渣每服一二合得少汗則愈日夜數服一以去風一以消血結如妊婦折傷胎死在腹中服此即產○一方無獨活只用大豆炒焦淋酒服。

獨活酒。治產後中風。

獨活一斤 桂心三兩 秦艽五兩

右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服。

雞矢酒。治產後中風及百病並男子中一切風神効。

用生地黃九如桐子大每服五十九丸忌別溫酒或當歸湯下

酒去風通過
身之氣益肝
主筋風去氣
行血統筋藥
肝風散故治
一切百病

交加妙法絕
妙絕神

烏雞糞一升
炒黃
大豆一升
炒令
聲絕勿焦

右二味以清酒三升乘熱先淋雞糞次淋大豆取汁每服一升
溫服取汗病重者凡四五服無不愈

交加散 治產先後百病兼治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮
痛氣多血少結聚為瘕產後中風並宜服之

生地黄一升研取
自然汁
生薑十二兩研
取自然汁

右將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各稍乾焙為細末每
服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可離

一物獨活湯 治產後中風虛人不可服他藥者此藥及一物白
鮮湯主之亦可與獨活合煮服

川獨活三兩細切以水三升煮取一升分服飲酒者亦可酒

產後中風語訕四肢拘急

水煮○白鮮皮亦依獨活法

羌活散○治產後中風語澁四肢拘急

羌活三兩爲末每服五錢水酒各半盞煎服

右產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以四物四君子相與各半導對分兩服之可也

○發瘧一作瘧

郭稽中曰產後汗出多而變瘧者因產後血虛腠理不密故多汗出遇風邪搏之則變瘧也口噤不開背強而直如發癰瘻者狀搖頭馬鳴身反折須臾又發氣息如絕宜速斡口灌小續命湯稍緩卽汗出如雨手摸空者不可治也

薛氏曰產後發瘧因去血過多元氣虧極或外邪相搏以致牙關

物類彙編 卷二十二
緊急四肢痙強。或腰背反張。肢體抽搐。若有汗而不惡寒者。曰柔
痙。無汗而惡寒者。曰剛痙。由亡血過多。筋無所養而致。故傷寒汗
下過多。潰瘍膿血大泄。多患之。乃敗證也。急以十全大補湯大補
血氣。如不應。急以附子。或保無虞。若攻風邪。死無疑矣。

夷堅志云。杜王治郝質子婦。產四日。痙瘓戴眼。背反張。王以爲
痙病。與大豆紫湯。獨活湯而愈。政和間。余妻方分娩。猶在蓐中。忽
作此證。頭足反接。相去幾二尺。家人驚駭。以數婢強拘之。不直。適
記所云。而藥草有獨活。乃急爲之。召醫未至。連進三劑。遂能直。醫
至。卽愈矣。更不須用大豆紫湯。古人處方。神驗屢矣。

陳臨川曰。凡產後口噤。腰背強直。角弓反張。皆名曰痙。又名曰瘓。
古人察有汗無汗。以分剛柔。陰陽而治。今產寶諸書。有中風口噤。

古人家有汗無汗。以分剛柔。陰陽而治。今產寶諸書。有中風口噤一門。又有角弓反張一門。其實一也。如增寒發熱有類傷寒。皆不
論及。豈可只以一二藥治之。

按素問有瘧字。而無瘧字。仲景太陽經有瘧病。而無瘧方。則今書中瘧字。乃瘧字傳寫之誤也。夫勁瘧二字。諧體諧聲。而瘧之病狀。有項背勁急反張之相。則從瘧字無疑。若瘧字于義莫解。故當以瘧字爲正。且寒主收引。風寒在太陽經。而項背強直者。太陽筋病也。諸方皆主續命。從仲景論矣。郭氏不問產後虛實邪之有無。而槩宗之。似乎一偏。至薛氏又爲產後亡血過多。非急用十個大補。不可若攻風邪。死無疑矣。又一見也。及夷堅志案。以大豆紫湯。獨活湯而愈者。則又主于風矣。是續命亦不爲妄。但本方有麻黃附子。于氣血兩虛之人。不可輕用。而郭氏論

又有速灌之說。稍緩卽汗出如雨。反不以麻黃爲忌。何其語之切也。二說均不可廢。臨證之際。詳之可也。

小續命湯。治產後汗多變瘧。口噤首強。或搖頭馬嘶。不時舉發。氣息如絕。

方見前中風。

陳臨川云。陳無擇評曰。產後汗出多變瘧。亦令服小續命湯。此又難信。旣汗多。如何更服麻黃。官桂。防已。黃芩。輩。不若大豆紫湯爲佳。局方大聖散。亦夏藥也。愚觀朱奉議云。凡剛柔三瘧。小續命湯並可加減與之。若柔瘧自汗者。去麻黃。加葛根之說。朱奉議必有所據。雖大豆紫湯。大聖散。良亦不可偏見。曲說有妨古人之意。

瘧瘧皆強。口噤直視。煩熱脈緊大者。不治。

大豆紫湯。治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風癱瘓背強口噤直視煩熱脈緊大者不治。

方見前中風。

大豆湯。治產後卒中風發瘧倒悶不知人及妊娠挾風兼治在

蓐諸疾。

大豆

五升炒令微焦

葛根

獨活各雨

防己

六雨

防己行十二經虛者忌用今分兩且獨多宜斟酌

右咬咀每服五錢酒二盞煎至一盞半去渣溫服不拘時日三服。

一方。治產後中風諸骸疼痛自汗出者及餘百疾。

獨活

八雨

當歸

四雨

右咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取微汗。

敗醬近無識者不知當以何物代之

地黃酒妙甚

若中氣者加桂心二兩不瘥更作

羚羊角飲子 治產後氣實腹中堅硬兩脇脹滿心中煩熱渴欲

飲水欲成剛症中風之疾

羚羊角半兩 防風

羌活

桔梗並去 敗醬各八錢

桂心

柴胡

大黃酒浸過煨各一兩一錢

右以咀每服五錢水一大盞半同煎至一盞去渣溫服不拘時更服地黃酒用地黃切一升炒令黑甕中下熱酒三升密封口煮令減半任意服之

防風當歸散

防風

川芎

當歸

地黃各五錢

若到每服一兩水三盞煎至二盞溫服

婁氏曰續命湯大豆紫湯舉卿古拜散太陽厥陰藥也邪實脈

防風當歸散治之為妙

雙氏曰：續命湯、大豆紫湯、舉卿古拜散、太陽厥陰藥也。邪實脈

浮弦有力者，固宜。但產後血氣大虛之人，不宜輕發其表。但以
防風當歸散治之為妙。

○瘕瘕

瘕瘕者，抽搐
伸縮也。

丹皮鈎藤為
肝火而用。

所謂虛象者，
土虛反見風
木之化也。

薛氏曰：瘕者，筋脈拘急也。瘕者，筋脈張縱也。經云：肝主筋而藏血，
蓋肝氣為陽為火，肝血為陰為水。前證因產後陰血去多，陽火熾
盛，筋無所養而然耳。故瘕疽膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰
散，亦多致此。治法當用八珍，加丹皮鈎藤以生陰血，則陽火自退。
諸證自愈。如不應，當用四君、芎歸、丹皮鈎藤以補脾土，蓋血生于
至陰。至陰者，脾土也。故小兒吐瀉之後，脾胃虛損，亦多患之。乃虛
象也。無風可逐，無痰可消。若屬陽氣脫陷者，用補中益氣，加薑桂。
陽氣虛敗者，用十全大補，加桂附。亦有復生者。此等證候，若肢體

真假虛實之辨

惡寒脈微細者此為真狀若脈浮大發熱煩渴此為假象惟當固本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗出如水余謂前藥辛香桂散真氣勝理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實勝理收斂直氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遙散大補湯調理而痊

一產婦先胸脇乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脈弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養經先用加味逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸證悉愈

一婦人發熱遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脈弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘵也肝主小便其色青入肝則赤法當滋陰

補人產後血風患此以小續命湯數服而安

前止言虛而
施補此又因
風而治風其
見圓通之妙

血清肝火。遂用加味逍遙散。不數劑。諸證悉退而安。

一婦人產後。血風患此。以小續命湯。數服而安。

產後因虛傷風。癱瘓同傷寒表證。未傳入裏。宜服防風湯。

防風湯。治風虛發熱。項背拘急。肢體不隨。恍惚狂言。來去無時。

不自覺悟。亦治腳氣緩弱甚効。此藥溫和不虛人。

秦艽

獨活

麻黃

半夏

防風

升麻

防己

白朮

石膏

白芍

黃芩

當歸

遠志

骨

人參

去甘草各一兩

右為釐末

每服四錢

水二中盞

生薑七八分

煎至一盞

去滓取

清汁六分

入麝香末少許

食後臨卧帶熱服

華陀愈風散

方見前中風

此即愈風湯當歸散。治產後中風牙關緊急不省人事口吐涎沫手足痲痺。

當歸去

荆芥穗各等分

右為細末。每服二錢。水一盞。酒半盞。煎至半盞。灌之。如牙關緊急。漸開微微灌之。但下咽即生。屢用救人。大有神效。

增損柴胡湯。治產後感冒證。手足牽搐。涎潮昏悶。

柴胡三錢

黃芩一錢二分

人參

甘草炙

半夏各一錢

黃芪一錢

石膏二錢

知母一錢

右取咀分二服。水二盞。生薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

秦艽湯。前證已去。次服此藥。去其風邪。

秦艽

芍藥

柴胡各一錢七分

防風

黃芩各一錢二分

人參

半夏各二錢

甘草炙一錢三分

此方榮肝去風。是肝胆經寒熱藥。

此以小柴胡。合白虎加黃芪。治虛熱。飲麥怪諸症。乃陽明少陽藥也。內无血藥。亦有見。

人參 半夏 各二 甘草 炙 一錢

右吹咀作二帖每帖加生薑三片未煎食遠服

拘攣

大全云產後中風筋脈四肢攣急者是氣血不足臟腑俱虛月內未滿起早勞役動傷臟腑虛損未復為風所乘風邪冷氣初客于皮膚經絡則令人頑痺不仁羸乏少氣風氣入于筋脈挾寒則攣急也

薛氏曰肝屬木而主筋前證若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參前雜證諸風血方論治之

一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安

產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠余謂氣血虛弱用十全大補加炮薑數劑漸愈去薑又數劑及逍遙散而痊

舒筋湯治一切筋骨拘攣疼痛蓋因風濕所傷氣血凝滯經絡不行所致其效如神

羌活

片子薑黃

甘草

炙各二錢

海桐皮

去外皮

當歸

赤芍

白朮

各一錢

右切作一服加生薑三片水煎去滓磨沈香水少許入內溫服

止痛食後腰以下痛食前

芩藟散

治產後中風四肢筋脈疼痛攣急背項強急

芩藟

羌活

當歸

酸棗仁

炒

羚羊角屑

各七錢半

防風

牛蒡子

炒各一兩

桂心

薔薇

各半兩

此即防風羚羊角湯但分兩少異而牛蒡獨多者以其能去皮虛

利腰脚也

薛氏曰此方如不應當用八珍湯更不應用十全大補湯

勞傷各以

防風

牛旁子

桂心

赤芍

風通十二經
利腰肋也

觀薛氏所言
亦死治風后
議補要得其
竅

右咬咀。每服八錢。水煎溫服。不拘時。

薛氏曰。前方如不應。當用八珍湯。更不應。用十全大補湯。

防已膏。治產後中風。四肢筋脈攣急。身體麻痺。

漢防已去皮 茵芋五兩

右咬咀。用酒五升。浸藥一宿。取猪肪脂一斤。文武火熬三上三下成膏。攤在紙花上。貼病人患處。以熱手不住摩膏上千遍。

○不語

本論所重在
敗血而七珍
散不用破血
之味為其本
于虛

大全云。人心有七孔三毛。產後虛弱多。致停積敗血。閉于心竅。神志不能明了。又心氣通于舌。心氣閉塞。則舌亦強矣。故令不語。但服七珍散。

薛氏曰。經云。太陽之脈散舌下。又云。脾之脈是動則病。舌本強。不

能言。又云。腎之別脈。上入于心。繫舌。本虛。則不能言。竊謂前證。若
心腎氣虛。用七珍散。腎虛風熱。地黃飲。大腸風熱。加味道遙散。加
防風。白芷。脾經風熱。秦艽升麻湯。肝經風熱。柴胡清肝散。加防風
白芷。脾氣鬱結。加味歸脾湯。加升麻。肝木太過。小柴胡加鈎藤鈎。
脾受土侮。六君加升麻白芷鈎藤鈎。肝脾血虛。用佛手散。脾氣虛。
用四君子。氣血俱虛。八珍湯。如不應。用獨參湯。更不應。急加附子。
補其氣。而生其血。若竟用血藥。則誤矣。

一產婦不語。用七珍散而愈。後復不語。內熱。脯熱。肢體倦怠。飲食
不進。用加味歸脾湯為主。佐以七珍散而愈。後因怒不語。口噤。腰
背反張。手足發搐。或小便見血。面赤。或青。或黃。或時兼赤。余曰。面

凡新產怒不可有

青。肝之本色也。黃者。脾氣虛也。赤者。心血虛也。用八珍湯加鈎藤

不語。由于干胃。李氏曰。有臨產服湯藥過多。胃濕使然者。熟料五積散。八君子湯。

青肝之本也。黃者脾氣虛也。赤者心血虛也。用八珍湯加鉤藤。

一鈎荻荅遠志漸愈。又用加味歸脾湯而痊。

不語由干胃。濕謂生痰也。而謂濕痰過多。何歟。五積散之用。又與

李氏曰。有臨產服湯藥過多。胃濕使然者。熟料五積散。六君子湯。○痰熱迷心不語者。導痰湯。或痰氣鬱滯。閉口不語者。用孤鳳散。七珍散。治產後虛弱。多致停積。敗血閉于心竅。神志不明。又心氣通于舌。心氣閉塞。則舌亦強。故令不語。

人參 石菖蒲 生地黃 川芎名一兩 細辛錢一

防風 辰砂另研各五錢

右為細末。每服一錢。薄荷煎湯調服。

胡氏孤鳳散。治產後閉目不語。

生白礬為末。每服一錢。熱水調下。

一方。治產後不語。

人參

石蓮肉不去心

石菖蒲各等分

右判每服五錢水煎服。

逐血補心湯。產後失音不語者。心肺二竅為血所侵。又感傷風

故也。

當歸一錢半 赤芍藥 生地黃 桔梗 蘇葉 前胡

茯苓 防風 牛胆南星 黃連 粉葛 紅花各錢

人參 升麻各七分 半夏一錢一分 甘草五分

右判加生薑三片。水煎空心服。

○狂言譫語。

大全云。產後語言顛倒。或狂言譫語。如見鬼神者。其源不一。須仔

細辯證。用藥治療。產後驚風。語言亂道。如見鬼神。精神不定者。研

好砂炒。酒下。龍虎丹。局方。二九。作一服。兼琥珀。地黃。光。服之。○

細辨證用藥治法。產後驚風。語言亂道。如見鬼神。精神不定者。研

好硃砂調酒下。龍虎丹。方見局方三丸作一服。兼琥珀地黃丸服之。

一則曰。產後心虛。敗血停積。上干於心。而狂言獨語者。當在乍見

鬼神。條求之。○二則產後臟虛。心神驚悸。志意不安。言語錯亂。不

自覺知。神思不安者。當在驚悸。條求之。○三則宿有風毒。因產心

虛氣弱。腰背強直。或歌哭。嗔笑。言語亂道。當作風症治。當在心

驚中風。條求之。○四則產後心虛。中風。心神恍惚。言語錯亂。當在

中風。恍惚。條求之。○五則產後多因敗血。迷亂心經。而顛狂言錯。

錯亂無常。或暈悶者。當于本卷血暈類求之。○六則因產後感冒

風寒。惡露斬然不行。憎寒發熱。如瘧。晝日明了。暮則譫語。如見鬼

狀。當作熱入血室治之。宜琥珀地黃丸。及四物湯。只用生乾地黃。

加北柴胡等分煎服。如不退者。以小柴胡湯。加生乾地黃。如黃芩。

即傷寒治法。

分兩煎服。愈。雖然以上諸症。大抵胎前產後。自有專門一定之法。毫髮不同。如產後首當逐敗生新。然後仔細詳辨。疾證不可妄立。名色自生。新意加減。方藥大宜對證。依古法施治。未有不安者也。薛氏曰。前證當固胃氣為主。而佐以見證之藥。若一味攻痰。則誤矣。

一產婦。形體甚倦。時發譫語。用栝子散稍愈。又用加味歸脾湯而愈。又因怒。仍狂言脇痛。小便下血。用加味逍遙散。以清肝火。養肝血。頓疾。又佐以加味歸脾湯而安。

一靈三聖散。治產後敗血冲心。發熱狂言。奔走脈虛大者。

乾荷葉

生乾地黃

牡丹皮

生蒲黃

另研各二錢

前三味濃煎湯。調入蒲黃末。一服即定。

前三味濃煎湯調入蒲黃末一服即定

奪命湯 產後血入心經語言顛狂健忘失志

方見前血暈

調經散 治氣血虛損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁如

見鬼神或言語譫妄

沒藥 琥珀并細桂心各一錢 赤芍藥 當歸酒浸各一錢

細辛二錢 麝香少許

右為細末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服或用蘇合香

丸一錢以童便調服即醒

栢子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語如見鬼神

栢子仁 遠志 生地黄 人參 當歸

桑寄生 防風 琥珀另研 甘草炙各等分

桑寄生治產後餘疾益血脈

產後用蘇合香忍芳香太過走散直氣以童便調服具見妙用

此方重在瘀血停滯不治陰虛發熱故用桂心射香

右為麤末。先用白羊心一個切片。以水三盞。煮取清汁七分。人藥末五錢。煎至六分服。

妙香散。治產後心神顛倒。語言錯亂。如見鬼神。

乾山藥 白茯苓 茯神去木 黃芪 遠志去心各一兩 人參

甘草 桔梗各五錢 辰砂三錢 木香二錢五分 麝香一錢

右為末。每服二錢。溫酒調服。○一方用生乾地黃當歸二味。煎

湯調服。立效。

烏金散。治產後三五日。或半月之間。忽狂言亂語。目見鬼神等

證曰。心者君主之官。神明出焉。故神非心有而天與之有也。大與之者。清淨明之氣也。是故心室清淨。則志意治。而神明舍之。失其

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 白朮 遠志肉

茯神去木 羌活 酸棗仁 辰砂另研 防風 香附子各二錢

言發自之病。才而神。半夏錢。白芷。陳皮五分。人參。麥門冬。烏。牛。服。

無所歸志無
所為而有疾
言發見之病
矣故心室不
可一日不精
而神明不可
一日不居也
夫生神者氣
養心者血故
氣血盛則神
明旺而思慮
精氣血虛則
神明衰而思
慮少如產后
三五半月之
間其氣血誠
虛矣若或卒
有所驚則神
出舍空邪以
其室遂使神
无所歸心无
所主而狂亂
生矣所謂邪
者風痰也敗
血也本方以
羌活芷蝎天
麻半夏以去
風痰四君四
物以培氣血
血有虧疾則以

扶神去羌活 酸棗仁 辰砂另研防風 香附子各二錢
半夏^{三錢} 白芷 陳皮^{各一錢五分} 人參 麥門冬^{三各} 牛膝

天麻 全蝎^{各一錢} 甘草^{九分}

右劉作二服薑三片葱三条入金銀同煎服。

四物補心湯。治產後言語恍惚顛倒錯亂。

當歸^{五錢} 川芎 白芍藥 生地黃 白朮

半夏 桔梗 茯神^{各四錢} 陳皮^{三錢} 甘草^{一錢}

右劉為散。分作六服。每用薑三片水煎空心服。有熱加酒炒。

黃連二錢。無熱不用。

寧神膏。治失血過多。心神昏悶。言語失常。不得睡卧。

辰砂 乳香 酸棗仁^炒 人參 茯苓^{各一兩} 琥珀^{七錢半}

右為末。每服一錢。燈心棗仁煎湯調服。或蜜丸彈子大。薄荷煎。

生勝赤芍行
之氣有所滯
則以香附
皮理之
歸則格之以
茯神杏仁志
不定則定之
以辰砂遠志
而麥門冬
為清心要藥
金銀者為安
鎮之丹
以蒸美則內
通神明制方
者其神全者
與

湯化下一丸。

琥珀地黄丸。治心血虛而言語譫妄。

琥珀

另研

玄胡索

糯米炒赤去米

當歸各一兩

蒲黃炒匹兩

生地黄

生薑各二斤

右地黄生薑各另搗汁。留渣以生薑汁炒地黄渣。地黄汁炒生

薑渣。各乾與前四味俱為末。煉蜜丸如彈子大。每服一九當歸

湯煎下。

顛狂

大全云。療產後。因驚敗血。沖心。昏悶發狂。如有鬼祟。宜用局方大

聖澤蘭散。加好辰砂研令極細。每服加一字許。煎酸棗仁湯調下。

一服可安。

一服可安。

薛氏曰。前證乃血虛神不守舍。非補養元氣不可。仍於後各門五用。

一產後患前證。或用大澤蘭湯而愈後。又怔忡妄言。其痰甚多。用茯苓散補其心虛。頓愈。又用八珍散加遠志茯苓。養其氣血而瘥。一產婦亦患此證。用化痰安神等藥。病益甚。神思消鑠。余以爲心脾而氣不足。用大劑參朮。芩歸。茯苓。酸棗。三四斤。餘而安。乃以歸脾湯五十餘劑而愈。

大聖澤蘭散。治婦人血海虛冷。久無子息。及產後敗血冲心中。風口噤。子死腹中。劈開口。灌藥須臾。生下。便得無恙。治墮胎腹中。攻刺疼痛。橫生逆產。胎衣不下。血暈血癖。血滯血崩。血入四肢。一應血藏有患。及諸證。風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱往來。遍

身生瘡。頭痛惡心。經脈不調。赤白帶下。乳生惡氣。胎藏虛冷。數
曾墮胎。崩中不定。因此成疾。室女經脈不通。並宜服之。常服煖
子宮。和血氣。悅顏色。退風冷。消除萬病。兼療丈夫五勞七傷。虛
損等病。

澤蘭葉

石膏

研各二兩

生地黄

二兩

當歸

川芎

芍藥

蕪夷

甘草

炙各一兩七錢半

肉桂

一兩二錢半

厚朴

姜汁炒

白茯苓

防風

細辛

吳茱萸

湯洗七次

卷柏

栢子仁

微炒

桔梗

各二兩

黃草

人參

白朮

丹參

五味子

小椒

去目并閉口者微炒

川烏頭

炮去皮

乾薑

炮

藁朮

去

白芷

各七錢半

白薇

阿膠

碎炒燥合半兩

石為細末

每服二錢

空心臨臥

熱酒調下

若急疾不拘時日三

人之神以心
為宅水銀之
液以珠砂為
宅心水銀之
平心水銀之
液通乎神方
以妙應元方
銀以圓通不
則二者皆萬
劫不長或以
類從為然心
火之下陰精
承之則安水
銀之液黑銀
制之則定所
以皆皆以真
水制真火也
本方以孔香
通心氣砂未
養心而歸未
安也神歸則
舍也神歸則
睡安矣

服。

抱膽丸。

治產後過驚發狂。或遇經行發狂。

水銀二兩

黑鉛二兩

硃砂二兩
細研乳香二兩
細研

右將黑鉛八銖內火鑄開。下水銀攪結成砂子。下硃砂乳香乘

熱用椰子槌研勻。丸如雞頭黃大。每服一丸。空心薄荷湯下。得

睡勿驚覺。覺來即安。○妙香散亦善。

辰砂遠志丸。

治產後中風驚狂。起卧不安。或痰涎上湧。

石菖蒲

遠志

人參

茯神

辰砂

川芎

山藥

鐵粉

細辛

麥門冬

大麻

半夏

南星

白附子

右為末。薑汁煮糊丸。如菜豆大。外以硃砂為衣。每服三十丸。臨

臥薑湯下

加味八珍湯。產後顛狂乃血虛神不守舍。非補養元氣不可用。

此或茯苓散歸脾湯。

下二方見后
驚悸門

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎

芍藥 熟地黃 遠志 茯神各一

右剉加姜棗水煎服。

○乍見鬼神。與前顛狂譫語門參看。

大全云。心主身之血脈。因產傷以耗血脈。致心氣虛。其敗血停積。上干于心。心不受觸。遂致心忪煩躁。卧起不安。乍見鬼神。言語顛錯。醫人不識。呼為風邪。如此為治。必不得愈。但服調經散。每服加

一捻
在加龍腦

龍腦一捻得睡即安。

前論止言血虛。用補血藥。仁散大抵此證皆心脾血少之所致。但調補胃

龍腦一捻得睡即安

前論止言瘀血而不言痰此言瘀而又治痰但調胃氣設果有痰亦須觀人頭怯為之脈虛者豈可加柴胡但症則可

薛氏曰前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用寧仁散大抵此證皆心脾血少之所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼穴可愈其或不起多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前證或用調經散愈而復作仍服前藥益甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八珍湯夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈雲岐治產後發熱証言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

調經散方見前証言諸語

琥珀散治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

人參 茯神 生地黃 阿膠 各七錢 硃砂 五錢 另研

甘草

琥珀

鐵粉另研

麝香另研各一錢

右為細末。每服三錢。用金銀煎湯調下。

茯神散。治產後血邪。心神恍惚。言語失度。坐臥不安。

茯神

去木一錢

人參

黃芪

赤芍藥

牛膝

琥珀

研

龍齒

研各七錢半

生地黄

一兩半

桂心

兩

右為末。每服三錢。水煎服。

一方。治產後血暈。心迷狂亂。恍惚如見鬼。

生益母草

三合根亦可

生地黄汁

二合

童便

合

雞子清

三枚

右同煎三四沸。後入雞子清攪勻。作一服。

○驚悸

太全云。產後臟虛。心神驚悸。皆由體虛。心氣不足。心之經為風邪。

凡逐瘀之藥。必香。然造方不若。香不燥。熱為清。降。火逐瘀聖藥。益血時宜者。也。氣虛者忌用。

所乘也。或恐懼憂。怕。令。心。氣。受。于。風。邪。和。搏。于。心。則。驚。悸。下。自。安。若。...

所乘也。或恐懼憂怕，令心氣受于風和，搏于心則驚，驚下自安。若驚不已，則悸動不足，其狀目睛不轉而不能動，診其脉動而弱者，驚悸也。動則為驚，弱則為悸矣。

薛氏曰：按人之所主者，心心之所主者，血心血一虛，神氣不守，此驚悸所由作也。當補氣血為主。

一產婦患前證，二度服琥珀地黃丸，局方妙香散，隨效。再患服之，其證益甚，而脈浮大，按之如無，發熱惡寒，此血氣俱虛，用十全大補加味歸脾二湯各百餘劑，而愈。後遇驚悸，勞怒復作，仍服前藥，加味四物湯，治產後血少怔忡無時。

當歸 川芎 白芍藥炒 熟地黃酒洗 茯神去木各一錢

遠志心法 酸棗仁炒各七分

右咬咀水煎食遠服。

白茯苓散。治產後心神驚悸。言語失常。

白茯苓

人參

熟地黄

各一兩半

黃芪

當歸

白芍藥

遠志

麥門冬

桂心

甘草

各一兩

石菖蒲

桑寄生

各七錢半

右咬咀每服八錢水一大盞半生薑五片棗三枚竹葉三七片。

煎至一大盞去滓溫服無時。

熟乾地黄散。治產後心神驚悸神思不安。

熟乾地黄

二兩

黃芪

白薇

龍齒

另研各一兩

茯神

去木

人參

羌活

遠志

各七錢

桂心

防風

甘草

各半兩

熟氣血藥為主似矣而以羌活為佐者豈果有風邪

右咬咀每服五錢水一大盞半生薑五片棗三枚煎至一大盞

煎之耶

凡產後方古
人喜用熱藥
今人仍古方
者亦十之九
此方以芎歸
姜桂為主似
本熱炭為之
溫血行血則
可甚謂其能
調和血氣安
神鎮驚則未
可也惡逆者
悉再詳之

右咬咀每服五錢水一大盞半生薑五片棗三枚煎至一大盞
去滓溫服不拘時一方無黃芪有荆芥

產乳七寶散初產後服之調和血氣補虛安心神鎮驚悸

當歸 川芎 人參 白茯苓 桂心

羚羊角燒存性 硃砂水飛各二錢 乾薑一錢

右為細末每服一錢用羌活豆淋酒調下不飲酒用清米飲調

下如覺心煩熱悶以麥門冬去心煎湯調下若心下煩悶

而痛用童便調下若覺心胸煩熱即減薑桂心寒却加之

腹痛加當歸心悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不思飲

食或惡心如人參虛煩加茯苓以意斟酌旦二夜一服之

參散治產後臍腑虛心怔驚悸言語錯亂

此方活涼氣
血並補而治
瘵不用燥劑
清心不入苦
寒可補辛熱
之未備而獨
活防風又治
風升舉之法
須察之

妙在用銀二
斤

人參

麥門冬

去心各八錢

茯神

遠志

去心

獨活

防風

生地黄

甘草

天竺黃

另研

龍齒

朱砂

小飛各四錢

牛黃

另研

白薇

各一錢

龍腦

另研

麝香

一錢

右為細末每服二錢薄荷酒調下不拘時

琥珀散

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂

另研

沒藥

琥珀

並研細

當歸

等分

右為細末每服二錢空心日午臨臥白湯調下

茯苓散

治產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪所致

茯苓

一方用茯神

生地黄

各三兩

遠志

白薇

龍齒

各二兩五錢

人參

防風

獨活

各二兩

右為末以銀一斤水二斗五升煮取七升下諸藥煮取三升溫

治產後多虛羸弱甚大汗利皆至于死此重虛故也若中

妙在用銀一

右為未以銀一斤水一斗五升煮取七升下諸藥煮取三升溫

既不宜大汗何必用羌活三兩所未信也下竹瀝一升妙甚

分三服。昆崧菜猪肉生冷。一方加荆芥二兩甘草二兩二錢半

一方治產後多虛羸弱若大汗利皆至于死此重虛故也若中

風語謬昏悶不知人者宜服此

人參 茯苓 羌活 遠志 大棗 各二兩 竹瀝 一升

右用水六升煮取二升下竹瀝更煎二升半分三服

歸脾湯 治產後血氣大虛心神驚悸怔忡不寐或心脾傷痛坐

臥少食或憂思傷脾血虛發熱

人參 黃芪 炒 白朮 炒 白茯苓 龍眼肉

當歸 遠志 去心 酸棗仁 炒 各一錢 木香 甘草 各五分

右加薑棗煎服。加柴胡牡丹皮各加味歸脾湯

遠志丸 治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹中急痛或時

怕怖夜卧不寧

遠志

麥門冬

黃芪

當歸

人參

白朮

獨活

白茯苓

桂心

栝子仁

山茱萸

石菖蒲

熟地黃

鍾乳粉

阿膠

碎炒各一兩

右為細末煉蜜和搗五七百下

化如桐子大每服三十丸溫酒送下不拘時日進三服

白茯苓丸

治產後心虛驚悸神志不安

白茯苓

熟地黃

人參

桂心

遠志

去心

石菖蒲

栝子仁

琥珀

另研各半兩

右為細末煉蜜和搗三百下丸如桐子大每服三十丸不拘時粥飯送下

此溫補法于虛寒者宜之然心虛則熱收于內用辛藥又當斟酌

恍惚

自不語至恍惚等症有謂氣血虛有謂敗血入心有謂風邪所乘

大全云產後中風恍惚者白心主血血氣通于榮衛臟腑遍行經絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足即為風邪所乘則令心神恍惚不定也

一皆各為心風然此風從何來當從何治前人亦未

薛氏曰前證當大補血氣為主而佐以後方為善蓋風為虛極之假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

之悉但言治然治風而用密立齊則以大補氣血為主各有所見在臨症酌用

一產婦患前證盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左日牽緊兩唇抽動小便自遺余謂肝火熾盛用十全大補加鈎藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

以虛中之火故用如是耳

千金方治產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致

蓋古方恒以
桂為補今之
治者又畏其
太熱反以傷
血尊古法今
所當因病致
宜也
此涼心之劑
心熱者宜之

真產後中風
省直之若曰
虛風所為則
不宜用風藥
矣

漢陰雜錄

卷十二

三

茯苓^{三兩} 芍藥^{二兩} 當歸 桂心 甘草^{各一兩}

麥門冬^{去心} 生薑^{一兩} 大棗^{三十枚}

右為散用水三升煎取一升去滓分作兩服

經效方 療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚

茯神 當歸 芍藥 人參 麥門冬^{去心}

酸棗仁^炒 黃芩 甘草 白蘚皮^{各二兩} 大棗^{七枚}

右為麤末水二升煮取七合去滓溫服

琥珀散 治產後中風恍惚語澁心神煩悶四肢不隨

琥珀^{另研} 茯神^{去木各一兩} 遠志^{去心} 石菖蒲 人參

黃芪 麥門冬^{去心} 芎藭 赤芍 防風

獨活 桑寄生 羚羊角屑^{各半} 甘草^{炙二錢半}

右以咀每服五錢水煎溫服不拘時

此方治產後中風心忪恍惚言語錯亂煩悶睡臥不安

此與前方不遠志散。治產後中風。心神恍惚。言語錯亂。煩悶。睡臥不安。桂心故非真中風者。不敢服。可溪有云。北方之人。真中風者。恒有之用方。皆是熱生熱。熱生風。且如恍惚錯亂。煩悶不安。皆熱也。何敢用焉。

右咬咀。每服五錢。水煎溫服。不拘時。

遠志散。治產後中風。心神恍惚。言語錯亂。煩悶。睡臥不安。

遠志去防風去當歸去茯神去酸棗仁炒

麥門冬去桑寄生去獨活去羚羊角屑各半桂心各七錢半

甘草炙半兩

右咬咀。每服五錢。水煎服。

天麻丸。治產後中風。恍惚。語澁。四肢不隨。

天麻去防風去羌活去朱砂水飛各一兩僵蚕炒七錢半

乾蝎炒五靈脂炒白附子炮各半兩雄雀糞炒牛黃另研各二錢半

右為細末。糯米飯為丸。如梧子大。每服二三十丸。薄荷酒送下。

日進二服。

辰砂遠志丸

主產後中風消風化痰安神鎮心

辰砂

遠志肉

甘草煮

石菖蒲

人參

茯神

去木各五分

川芎

山藥

麥門冬

去心

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

鐵粉

各一兩

右爲末薑汁煮糊丸如漿豆大別以硃砂爲衣每服三十丸夜臥生薑湯下

